

当院で作成したワクチン接種に関するポスターを県や他院へも提供

all-byoinでワクチン接種！

防げ！新型コロナ感染

all-byoinでワクチン接種！

わたしたちが健康でなければ
患者さんを診ることはできません。
自分自身はもちろん、家族や
一緒に働く仲間を守るためにも
ワクチン接種を受けましょう。

みんなでワクチンを
受けよう！

かわいい説明動画が
院内ホームページで
視聴できます！

all-byoinでワクチン接種！

ワクチンの
有効性は？

**約95%
すごく高いです！**

mRNAワクチン(ファイザー社)の有効性は
インフルエンザの不活化ワクチンより高く、
感染や重症化の予防も期待できます。

all-byoinでワクチン接種！

2回目接種の
目的を再確認！

**2回接種で
十分な免疫を獲得！**

今回当院で使用しているファイザー製の「mRNAワクチン」は、
1回では効果が不十分な可能性があり、
日本では2回接種のみ厚労省から承認されています。

all-byoinでワクチン接種！

接種前に
準備することは
ある？

解熱鎮痛薬の準備を！

2回目の方が副反応を訴える人が多いと報告されています。
各自で対応できるよう、アセトアミノフェンを含む市販薬
「タイレノール」「パファリンルナ」などを用意しましょう。
困ったら薬局などの薬剤師・登録販売者にご相談ください。
また、薬が体調不良になっても支障が出ないよう、
部署内で業務内容や体制を確認しておきましょう。

all-byoinでワクチン接種！

ワクチンを
接種したから
もう飲み会OK？

**ワクチンを接種しても
100%安全ではありません**

ワクチンを接種後も今までと
変わらず、用心しましょう！

all-byoinでワクチン接種！

副反応は
あるの？

**ありますが…
重度は100万分の11.1**

接種部位の痛み、倦怠感や頭痛などが出る場合がありますが、
軽症と中等症がほとんどです。
ただ、アレルギー歴があるとアナフィラキシーが心配ですので、
即時対応できるよう応急処置の体制を整えています！

all-byoinでワクチン接種！

なぜ
医療者から？

**患者も自分も
安心できる病院に**

県民の皆さんが安心してワクチンを接種できるよう、
医療者が率先して接種し、
安全性や有効性を伝えていきます。
そして、患者さんにも私たちも安心できる病院にしましょう。

all-byoinでワクチン接種！

副反応が
重い時の対応は？

**薬を飲んで安静に。
それでもつらいときは…**

① まず、アセトアミノフェンを含む市販薬を服用しましょう。
② それでもつらいときは、アセトアミノフェンを含まない市販薬を服用
しましょう。※②を先に服用せず、順番通りに服用してください
③ 薬が効かないときは、当院のコロナワクチンセンターに電話してくだ
さい。→PH5-72695 or 73182 → 必要に応じて総合診療科に受診
※夜間・休日は、当院代表 (043-222-7171) から救急科へ。
※帰宅後など、自宅に対応する場合はお近くの医療機関を受診

all-byoinでワクチン接種！

病院長2回目体験記

水曜日接種
- 注射部位の痛みが現れたのは、当日の夜(1回目は翌日)。
木曜日薬を服用
- 午後、やや「腎臓が寒い感じ」を覚え、アセトアミノフェン
を含む解熱鎮痛薬を服用。
- 21時頃に帰宅。体温は36.6℃、念のためアセトアミノフェン
を含む解熱鎮痛薬をもう一度服用して就寝。
金曜日に痛み消失
- 朝の体温は36.8℃、平熱より高のだったが体調に異常なく、
終日勤務。別の痛みはほとんど消失。

1回目の接種前

2回目の接種前

2回目の接種後