2024年10月作成

千葉大学医学部附属病院

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
PAV(PCZ(PO):60day8-21+ACNU:75day1+VCR:1day8 29)q6w神経膠腫	ニドラン注射用	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	42日
	オンコビン注射用	1	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 8, 29	
	プロカルバジン	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 8-21	
ACNU(80) q8w 脳腫瘍	ニドラン注射用	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	56日
PAV(PCZ(po):60 d8-21+ACNU:70 d1+VCR:1.4 d8 29)q8w 神経膠腫	ニドラン注射用	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	56日
	オンコビン注射用	1.4	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 8, 29	
	プロカルバジン	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 8-21	
CARE【CBDCA(450)d1+VP-16(150)d1-3】 q4w 脳腫瘍	カルボプラチン点滴静注液	450	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	エトポシド点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3	
ｱﾊﾞｽﾁﾝ(10/kg) q2w 悪性神経膠腫	アバスチン点滴静注用	10	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
TMZ(150)day1-5 post-RT q4w 悪性神経膠腫	テモダール点滴静注用	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	28日
TMZ(75 連日42日間)+RT q10w 悪性神経膠腫	テモダール点滴静注用	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	連日42日間	70日
ICE(IFO:900+CDDP:20+ETP:60)d1-5 q6w 頭蓋内原発胚細胞腫瘍	注射用イホマイド	900	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	42日
	シスプラチン点滴静注	20	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
	エトポシド点滴静注液	60	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	