

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
TMZ(150)day1-5 post-RT q4w 悪性神経膠腫	テモダール注・点滴静注用	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	28日	悪性神経膠腫
TMZ(75 連日42日間)+RT q10w 悪性神経膠腫	テモダール注・点滴静注用	75	mg/m ²	点滴静注	連日42日間	70日	悪性神経膠腫
PAV(PCZ(PO):60day8-21+ACNU:75day1+VCR:1day8 29)q6w 神経膠腫	ニドラン注	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1	42日	神経膠腫
	オンコピン注	1	mg/m ²	点滴静注	Day 8, 29		
	プロカルバジン	60	mg/m ²	内服	Day 8-21		
ACNU(80) q8w 脳腫瘍	ニドラン注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1	56日	脳腫瘍
アバステン(10/kg) q2w 悪性神経膠腫	アバステン注・点静用	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	悪性神経膠腫
CARE【CBDCA(450)d1+VP-16(150)d1-3】 q4w 脳腫瘍	カルボプラチン注NK	450	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	脳腫瘍
	エトポシド注・点静用	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3		