

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
hd MTX(100/kg) q2w CNS 悪性リンパ腫	メトレキセート注	100	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	CNS 悪性リンパ腫
hd MTX(100/kg)d1+リツキシマブBS(375)d8 q2w CNS 悪性リンパ腫	メトレキセート注	100	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	CNS 悪性リンパ腫
	リツキシマブBS注	375	mg/m ²	点滴静注	Day 8		
リツキシマブBS(375)+MPV (奇数コース) q2w CNS 悪性リンパ腫	リツキシマブBS注	375	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	CNS 悪性リンパ腫
	オンコピン注	1.4	mg/m ² (最大2mg)	点滴静注	Day 2		
	メトレキセート注	3500	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
	プロカルバジン	100	mg/m ²	内服	Day 2-8		
リツキシマブBS(375)+MPV (偶数コース) q2w CNS 悪性リンパ腫	リツキシマブBS注	375	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	CNS 悪性リンパ腫
	オンコピン注	1.4	mg/m ² (最大2mg)	点滴静注	Day 2		
	メトレキセート注	3500	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
Ara-C(3000)d1-2 q4w CNS 悪性リンパ腫	キロサイド注	3000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2	28日	CNS 悪性リンパ腫