2024年10月作成

千葉大学医学部附属病院

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
hd MTX(100/kg) q2w CNS 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	メソトレキセート注	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
hd MTX(100/kg)d1+ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ BS(375)d8 q2w CNS 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	メソトレキセート注	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	リツキシマブＢＳ点滴静注	375	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 8	
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ BS(375)+MPV (奇数ｺｰｽ) q2w CNS 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	リツキシマブＢＳ点滴静注	375	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	オンコビン注射用	1.4	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
	メソトレキセート注	3500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
	プロカルバジンカプセル	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 2-8	
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ BS(375)+MPV (偶数ｺｰｽ) q2w CNS 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	リツキシマブＢＳ点滴静注	375	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	オンコビン注射用	1.4	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
	メソトレキセート点滴静注液	3500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
Ara-C(3000)d1-2 q4w CNS 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	キロサイド注	3000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2	28日