2024年10月作成
千葉大学医学部附属病院

| レジメン名 | 抗がん剤 | 用量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 | 1クール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1(内服　d1-14)+CDDP(60 d1) q3w 胃癌 | シスプラチン点滴静注 | 60 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| CDDP(60)+TS-1(内服d1-14)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(8/kg) (初回) 胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | シスプラチン点滴静注 | 60 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| CDDP(60)+TS-1(内服d1-14)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(6/kg) (2回目以降) 胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 6 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | シスプラチン点滴静注 | 60 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| XELOX ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌 | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| XELOX(ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服ｄ1-14+L-OHP130)+ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ (360) q3w 胃癌 | オプジーボ点滴静注 | 360 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| SOX S-1(内服　d1-14)+L-OHP(100) q3w胃癌 | オキサリプラチン点滴静注液 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| SOX(S-1内服d1-14+L-OHP130)+ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ (360) q3w 胃癌 | オプジーボ点滴静注 | 360 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| SOX(S-1+ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ100)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(8ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg) q3w(1ｺｰｽ目) 胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| SOX(S-1+ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ100)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(6ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg)q3w(2ｺｰｽ目以降)胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 6 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| mFOLFOX6　5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 胃癌 | オキサリプラチン点滴静注液 | 85 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 14日 |
| | レボホリナート点滴静注用 | 200 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 2400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 持続注入 | Day 1-2 | |
| mFOLFOX6+ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ (240) q2w 胃癌 | オプジーボ点滴静注 | 240 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ | 点滴静注 | Day 1 | 14日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 85 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | レボホリナート点滴静注用 | 200 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 2400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 持続注入 | Day 1-2 | |
| CDDP(80)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ(内服d1-14) 胃癌 | シスプラチン点滴静注 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDDP(80)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ(内服d1-14)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(8/kg)　初回 胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | シスプラチン点滴静注 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| CDDP(80)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ(内服d1-14)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(6/kg)　2回目～ 胃癌 | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 6 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | シスプラチン点滴静注 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| CDDP(30)+CPT-11(60) bi-weekly 胃癌 | シスプラチン点滴静注 | 30 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液 | 60 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 15 | |
| PTX(80) day1 8 15 q4w 胃癌 | パクリタキセル点滴静注液 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28日 |
| weekly nabPTX(100 d1 d8 d15) q4w 胃癌 | アブラキサン点滴静注用 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28日 |
| nab-PTX(260) q3w 胃癌 | アブラキサン点滴静注用 | 260 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| ｻｲﾗﾑｻﾞ(8/kg) q2w 胃癌 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 14日 |
| wPTX+ｻｲﾗﾑｻﾞ 胃癌 初回 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | パクリタキセル点滴静注液 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28日 |
| wPTX+ｻｲﾗﾑｻﾞ 胃癌 2ｺｰｽ以降 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | パクリタキセル点滴静注液 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28日 |
| nabPTX(100 d1 8 15)+ｻｲﾗﾑｻﾞ(8/kg d1 15) q4w 胃癌 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | アブラキサン点滴静注用 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28日 |
| biweekly CPT11+ｻｲﾗﾑｻﾞ 胃癌 初回 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液 | 150 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| biweekly CPT11+ｻｲﾗﾑｻﾞ 胃癌 2ｺｰｽ以降 | サイラムザ点滴静注液 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| | ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液 | 150 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| CPT-11(150)単剤 d1 15 q4w 胃癌 | ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液 | 150 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1, 15 | 28日 |
| ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body) q4w 胃癌 | オプジーボ点滴静注 | 480 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ | 点滴静注 | Day 1 | 28日 |
| ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body) q2w 胃癌 | オプジーボ点滴静注 | 240 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ | 点滴静注 | Day 1 | 14日 |
| DTX(60) q3w 胃癌 | ドセタキセル点滴静注 | 60 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| DTX(40 day1)+S-1(po day1-14) q3w 胃癌 | ドセタキセル点滴静注 | 40 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | エスワン配合OD錠 | 80 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 内服 | Day 1-14 | |
| ｴﾝﾊｰﾂ(6.4ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg) q3w 胃癌 | エンハーツ点滴静注用 | 6.4 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| 初回 ﾋﾞﾛｲ+XELOX ﾋﾞﾛｲ(800)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌 | ビロイ点滴静注用（100ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/瓶） | 800 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| 【外来】維持 ﾋﾞﾛｲ+XELOX ﾋﾞﾛｲ(600)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌 | ビロイ点滴静注用（100ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/瓶） | 600 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| 【入院】維持 ﾋﾞﾛｲ+XELOX ﾋﾞﾛｲ(600)+ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌 | ビロイ点滴静注用（100ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/瓶） | 600 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 130 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | |
| 初回 ﾋﾞﾛｲ+mFOLFOX6　ﾋﾞﾛｲ(800)+5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 胃癌 | オキサリプラチン点滴静注液 | 85 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | 14日 |
| | レボホリナート点滴静注用 | 200 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | フルオロウラシル注 | 2400 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 持続注入 | Day 1-2 | |
| | ビロイ点滴静注用 | 800 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XELOX(ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP130)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ BS(8/kg)初回 q3w 胃癌 | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 8 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | |
| XELOX(ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP130)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ BS(6/kg) 2 回目以降 q3w 胃癌 | ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出) | 1000 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2 | 内服 | Day 1-14 | 21日 |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 100 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡ | 点滴静注 | Day 1 | |
| | トラスツズマブＢＳ点滴静注用 | 6 | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg | 点滴静注 | Day 1 | |