

パスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
08001-00	S-1(内服 d1-14)+CDDP(60 d1) q3w 胃癌	シスプラチン点滴静注	60	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08002-00	CDDP(60)+TS-1(内服d1-14)+トラスツズマブ BS(8/kg) (初回) 胃癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	60	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08002-01	CDDP(60)+TS-1(内服d1-14)+トラスツズマブ BS(6/kg) (2回目以降) 胃癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	60	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08003-00	XELOX かべシタビン内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		かべシタビン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡ × 2	内服	Day 1-14	
08004-00	XELOX(かべシタビン内服 d 1-14+L-OHP130)+オプジーボ (360) q3w 胃癌	オプジーボ点滴静注	360	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		かべシタビン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡ × 2	内服	Day 1-14	
08005-00	SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(100) q3w胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	100	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08006-00	SOX(S-1内服d1-14+L-OHP130)+オプジーボ (360) q3w 胃癌	オプジーボ点滴静注	360	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08007-00	SOX(S-1+オキサリプラチン100)+トラスツズマブ BS(8ミリグ ラム/kg) q3w(1コース目) 胃癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	100	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08007-01	SOX(S-1+オキサリプラチン100)+トラスツズマブ BS(6ミリグ ラム/kg)q3w(2コース目以降)胃癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	100	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08008-00	mFOLFOX6 5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
08009-00	mFOLFOX6+オプジーボ (240) q2w 胃癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	14日
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	

08010-00	CDDP(80)+カベシタビン(内服d1-14) 胃癌	シスプラチン点滴静注	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	
08011-00	CDDP(80)+カベシタビン(内服d1-14)+トラスツズマブ BS(8/kg) 初回 胃癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		シスプラチン点滴静注	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
08011-01	CDDP(80)+カベシタビン(内服d1-14)+トラスツズマブ BS(6/kg) 2回目～ 胃癌	カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
08012-00	CDDP(30)+CPT-11(60) bi-weekly 胃癌	カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	28日
		シスプラチン点滴静注	30	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15	
08013-00	PTX(80) day1 8 15 q4w 胃癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	60	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15	28日
08014-00	weekly nabPTX(100 d1 d8 d15) q4w 胃癌	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
08015-00	weekly nabPTX(100 d1 d8 d15) q4w 胃癌	アブラキサン点滴静注用	100	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
08015-00	nab-PTX(260) q3w 胃癌	アブラキサン点滴静注用	260	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
08016-00	サイラムザ(8/kg) q2w 胃癌	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
08017-00	wPTX+サイラムザ 胃癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日
		パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
08017-01	wPTX+サイラムザ 胃癌 2コース以降	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日
		パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
08018-00	nabPTX(100 d1 8 15)+サイラムザ(8/kg d1 15) q4w 胃癌	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日
		アブラキサン点滴静注用	100	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
08019-00	biweekly CPT11+サイラムザ 胃癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日
08019-01	biweekly CPT11+サイラムザ 胃癌 2コース以降	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15	28日
		サイラムザ点滴静注液	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日
08020-00	CPT-11(150)単剤 d1 15 q4w 胃癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15	28日
08021-00	オプジーボ(480/body) q4w 胃癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15	28日
08021-00	オプジーボ(480/body) q4w 胃癌	オプジーボ点滴静注	480	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	28日
08022-00	オプジーボ(240/body) q2w 胃癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	14日
08023-00	DTX(60) q3w 胃癌	ドセタキセル点滴静注	60	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
08024-00	DTX(40 day1)+S-1(po day1-14) q3w 胃癌	ドセタキセル点滴静注	40	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	
08025-00	エンハーツ(6.4ミリグ ラム/kg) q3w 胃癌	エンハーツ点滴静注用	6.4	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
08026-00	初回 ビロイ+XELOX ビロイ(800)+カベシタビン内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌	ピロイ点滴静注用(100ミリグ ラム/瓶)	800	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	
08026-01	【外来】維持 ビロイ+XELOX ビロイ(600)+カベシタビン内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌	ピロイ点滴静注用(100ミリグ ラム/瓶)	600	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	
08026-02	【入院】維持 ビロイ+XELOX ビロイ(600)+カベシタビン内服d1-14+L-OHP(130) q3w 胃癌	ピロイ点滴静注用(100ミリグ ラム/瓶)	600	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		カベシタビン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	

08027-00	初回 ビ`ロイ+mFOLFOX6 ビ`ロイ(800)+5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミク`ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
08028-00	XELOX(カ`シタビ`ン内服d1-14+L-OHP130)+トラスツズマブ` BS(8/kg)初回 q3w 胃癌	カ`シタビ`ン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミク`ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	100	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ` B S 点滴静注用	8	ミク`ラム/kg	点滴静注	Day 1	
08028-01	XELOX(カ`シタビ`ン内服d1-14+L-OHP130)+トラスツズマブ` BS(6/kg) 2回目以降 q3w 胃癌	カ`シタビ`ン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミク`ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	100	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ` B S 点滴静注用	6	ミク`ラム/kg	点滴静注	Day 1	
08029-00	mFOLFOX6 q2w+トラスツズマブ` BS q3w 初回 (1-3コース) 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	42日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	
		フルオロウラシル注	400	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	
		フルオロウラシル注	2400	ミク`ラム/㎡	持続注入	Day 1-2, 15-16, 29-30	
		トラスツズマブ` B S 点滴静注用	8	ミク`ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ` B S 点滴静注用	6	ミク`ラム/kg	点滴静注	Day 22	
08029-01	mFOLFOX6 q2w+トラスツズマブ` BS q3w 4コース以降 胃癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	42日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	
		フルオロウラシル注	400	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	
		フルオロウラシル注	2400	ミク`ラム/㎡	持続注入	Day 1-2, 15-16, 29-30	
		トラスツズマブ` B S 点滴静注用	6	ミク`ラム/kg	点滴静注	Day 1, 22	
08030-00	XELOX(カ`シタビ`ン内服 d 1-14+L-OHP130)+キイトルーダ` (200) q3w 胃癌	カ`シタビ`ン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミク`ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ`点滴静注	200	ミク`ラム	点滴静注	Day 1	
08031-00	SOX(S-1内服d1-14+L-OHP130)+キイトルーダ` (200) q3w 胃癌	エスワン配合OD錠	80	ミク`ラム/㎡	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミク`ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ`点滴静注	200	ミク`ラム	点滴静注	Day 1	

08032-00	XELOX+トラスツズマブ (8/kg)+キイトルーダ (200)初回 q3w 胃癌	カベシタピン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
08032-01	XELOX+トラスツズマブ (6/kg)+キイトルーダ (200) 2回目～ q3w 胃癌	カベシタピン錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグ ラム/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
08033-00	SOX+トラスツズマブ (8/kg)+キイトルーダ (200) 初回 q3w 胃癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	
08033-01	SOX+トラスツズマブ (6/kg)+キイトルーダ (200) 2回目～ q3w 胃癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグ ラム/㎡	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		キイトルーダ点滴静注	200	ミリグ ラム	点滴静注	Day 1	