2024年10月作成
千葉大学医学部附属病院

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
SOX S-1(内服　d1-14)+L-OHP(130) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	21日
	オキサリプラチン点滴静注液	130	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
SOX S-1(内服　d1-14)+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	21日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	7.5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
	オキサリプラチン点滴静注液	130	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
SIR S-1(内服　d1-14)+CPT-11(150) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	21日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
SIR+BEV S-1(内服　d1-14)+CPT-11(150)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	21日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	7.5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ (初回 400) + CPT-11(150) 大腸癌	アービタックス注射液(初回)	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	49日
	アービタックス注射液(2回目以降)	250	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 15, 29	
XELOX ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服 d1-14+L-OHP(130) q3w 大腸癌	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-14	21日
	オキサリプラチン点滴静注液	130	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1	
XELOX+BEV ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ内服d1-14+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	7.5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をC法に基づき算出)	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-14	
	オキサリプラチン点滴静注液	130	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ(1250/m2×2 day1-14)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をB法に基づき算出)	1250	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	21日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	7.5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
sLV5FU2+BEV q2w 大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
UFT(300 day1-21)+LV+BEV(5/kg day1 15) q4w大腸癌	ユーエフティ	300	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-21	28日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1, 15	
ﾛﾝｻｰﾌ(内服) d1-5 8-12 ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ (5/kg) d1 15 q4w　大腸癌	ロンサーフ	35	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-5, 8-12	28日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1, 15	
FOLFIRI原法 q2w 大腸癌	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI原法+BEV(5/kg) q2w 大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI原法+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ(6/kg) q2w 大腸癌	ベクティビックス点滴静注	6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	

FOLFIRI原法+2週毎ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI原法+ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ q2w 大腸癌	ザルトラップ点滴静注	4	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI原法+ｻｲﾗﾑｻﾞ 大腸癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI原法+ｻｲﾗﾑｻﾞ 大腸癌 2ｺｰｽ以降	サイラムザ点滴静注液	8	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	150	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI3 q2w 大腸癌	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1-2	
FOLFIRI3+BEV q2w 大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
FOLFIRI3+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ q2w 大腸癌	ベクティビックス点滴静注	6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI3+2週毎ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI3+ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ q2w 大腸癌	ザルトラップ点滴静注	4	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI3+ｻｲﾗﾑｻﾞ 大腸癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFIRI3+ｻｲﾗﾑｻﾞ 大腸癌 2ｺｰｽ以降	サイラムザ点滴静注液	8	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 3	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
XELIRI+BEV q3w 大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	7.5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ錠 (1回用量をE法に基づき算出)	800	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-14	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	

mFOLFOX6　5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
mFOLFOX6＋BEV　5-FU+L-OHP+LV＋BEV q2w 大腸癌	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
mFOLFOX6+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ q2w 大腸癌	ベクティビックス点滴静注	6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
mFOLFOX6+2週毎ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	2400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
FOLFOX"IRI"+ｼﾞｰﾗｽﾀ q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	165	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	3000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
	ジーラスタ皮下注	3.6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	皮下注	Day4	
FOLFOX"IRI"+BEV+ｼﾞｰﾗｽﾀ q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	レボホリナート点滴静注用	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液	165	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	
	フルオロウラシル注	3000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	持続注入	Day 1-2	
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
	ジーラスタ皮下注	3.6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	皮下注	Day4	
ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ(6/kg)単剤 q2w 大腸癌	ベクティビックス点滴静注	6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)+ﾔｰﾎﾞｲ(1/kg) q3w MSI-high大腸癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ヤーボイ点滴静注液	1	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)維持q2w Nivo+Ipi→Nivo MSI-High大腸癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)q2w MSI-high大腸癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body)q4w MSI-high大腸癌	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w MSI-high大腸癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400/body) q6w MSI-high大腸癌	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
biweekly ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(初回)+ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+ﾒｸﾄﾋﾞ q1w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	7日
	ビラフトビカプセル	300	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
	メクトビ錠	45	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(2回目以降)+ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ+ﾒｸﾄﾋﾞ q1w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	250	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	7日
	ビラフトビカプセル	300	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
	メクトビ錠	45	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(8/kg)+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(840/body) 初回 q3w 大腸癌	トラスツズマブＢＳ点滴静注用	8	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	パージェタ点滴静注	840	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS(6/kg)+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ(420/body) 2回目以降 q3w 大腸癌	トラスツズマブＢＳ点滴静注用	6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	21日
	パージェタ点滴静注	420	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	

【3週ごと】TEGAFOX q3w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	ユーエフティ	300	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	内服	Day 1-14	
	ロイコボリン	75	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	Day 1-14	
PRABITAS【従来】：ﾛﾝｻｰﾌ(d1夕-d6朝 d8夕-d13朝内服) ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ (5/kg) d1 15 q4w 大腸癌	ロンサーフ	35	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-5, 8-12	28日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1, 15	
PRABITAS【隔週】：ﾛﾝｻｰﾌ(d1夕-d6朝内服) ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ (5/kg) d1 q2w 大腸癌	ロンサーフ	35	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡×2	内服	Day 1-5	14日
	ベバシズマブＢＳ点滴静注	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	