

パスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
10001-00	SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(130) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグラム/錠	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10002-00	SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグラム/錠	内服	Day 1-14	21日
		ペバシズマブB S点滴静注	7.5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10003-00	SIR S-1(内服 d1-14)+CPT-11(150) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグラム/錠	内服	Day 1-14	21日
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10004-00	SIR+BEV S-1(内服 d1-14)+CPT-11(150)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	エスワン配合OD錠	80	ミリグラム/錠	内服	Day 1-14	21日
		ペバシズマブB S点滴静注	7.5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10005-00	アビタックス(初回 400) + CPT-11(150) 大腸癌	アビタックス注射液(初回)	400	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	49日
		アビタックス注射液(2回目以降)	250	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43	
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1, 15, 29	
10006-00	XELOX カベシリン内服 d1-14+L-OHP(130) q3w 大腸癌	カベシリン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグラム/錠×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10007-00	XELOX+BEV カベシリン内服d1-14+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	カベシリン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	ミリグラム/錠×2	内服	Day 1-14	21日
		オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		ペバシズマブB S点滴静注	7.5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
10008-00	カベシリン(1250/m2×2 day1-14)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	カベシリン錠(1回用量をB法に基づき算出)	1250	ミリグラム/錠	内服	Day 1-14	21日
		ペバシズマブB S点滴静注	7.5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
10009-00	sLV5FU2+BEV q2w 大腸癌	ペバシズマブB S点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/錠	持続注入	Day 1-2	
		フルオロウラシル注	400	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
10010-00	UFT(300 day1-21)+LV+BEV(5/kg day1 15) q4w大腸癌	ユーエフティ	300	ミリグラム/錠	内服	Day 1-21	28日
		ペバシズマブB S点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	
10011-00	ロンサーフ(内服) d1-5 8-12 アビタックス(5/kg) d1 15 q4w 大腸癌	ロンサーフ	35	ミリグラム/錠×2	内服	Day 1-5, 8-12	28日
		ペバシズマブB S点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	
10012-00	FOLFIRI原法 q2w 大腸癌	レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	14日
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/錠	持続注入	Day 1-2	
10013-00	FOLFIRI原法+BEV(5/kg) q2w 大腸癌	ペバシズマブB S点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/錠	持続注入	Day 1-2	
10014-00	FOLFIRI原法+ベクトレックス(6/kg) q2w 大腸癌	ベクトレックス点滴静注	6	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		リリチン塩酸塩点滴静注液	150	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグラム/錠	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/錠	持続注入	Day 1-2	

10015-00	FOLFIRI原法+2週毎ア-ビ`タックス(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10016-00	FOLFIRI原法+ザ`ルトラップ` q2w 大腸癌	ザルトラップ点滴静注	4	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10017-00	FOLFIRI原法+サイラムガ` 大腸癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10017-01	FOLFIRI原法+サイラムガ` 大腸癌 2コース以降	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10018-00	FOLFIRI3 q2w 大腸癌	レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	14日
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	点滴静注	Day 1-2	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10019-00	FOLFIRI3+BEV q2w 大腸癌	ヘパシズマブB S 点滴静注	5	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
10020-00	FOLFIRI3+ヘ`クティ`ックス q2w 大腸癌	ペクティビックス点滴静注	6	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10021-00	FOLFIRI3+2週毎ア-ビ`タックス(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	mg/ml	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10022-00	FOLFIRI3+ザ`ルトラップ` q2w 大腸癌	ザルトラップ点滴静注	4	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10023-00	FOLFIRI3+サイラムガ` 大腸癌 初回	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	
10023-01	FOLFIRI3+サイラムガ` 大腸癌 2コース以降	サイラムザ点滴静注液	8	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	mg/ml	点滴静注	Day 1	
		イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	
		フルオロウラシル注	2400	mg/ml	持続注入	Day 1-2	

10024-00	XELIRI+BEV q3w 大腸癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	7.5	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		カベシタビシ錠 (1回用量をE法に基づき算出)	800	ミグ ラム/㎡ × 2	内服	Day 1-14	
		イリリチン塩酸塩点滴静注液	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
10025-00	mFOLFOX6 5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レボホリナート点滴静注用	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
10026-00	mFOLFOX6 + BEV 5-FU+L-OHP+LV + BEV q2w 大腸癌	ペバシズマブ B S 点滴静注	5	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
10027-00	mFOLFOX6+ベグティックス q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	14日
		ベクティピックス点滴静注	6	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
10028-00	mFOLFOX6+2週毎7-ヒタックス(500) q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	400	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		フルオロウラシル注	2400	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
10029-00	FOLFOX"IRI"+ベグティックス q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		フルオロウラシル注	3000	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
		イリリチン塩酸塩点滴静注液	165	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		レボホリナート点滴静注用	200	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	
10030-00	FOLFOX"IRI"+BEV+ベグティックス q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	400	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		フルオロウラシル注	2400	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
		ベグティックス注射液	6	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		ペバシズマブ B S 点滴静注	5	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
		ベグティックス注射液	3.6	ミグ ラム	皮下注	Day4	
		フルオロウラシル注	3000	ミグ ラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
10031-00	ベグティックス(6/kg)単剤 q2w 大腸癌	ベクティピックス点滴静注	6	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
10032-00	オブジーボ (240/body)+ヤーボイ(1/kg) q3w MSI-high大腸癌	オブジーボ点滴静注	240	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	21日
		ヤーボイ点滴静注液	1	ミグ ラム/kg	点滴静注	Day 1	
10033-00	オブジーボ (240/body)維持q2w Nivo+Ipi→Nivo MSI-High大腸癌	オブジーボ点滴静注	240	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	14日
10034-00	オブジーボ (240/body)q2w MSI-high大腸癌	オブジーボ点滴静注	240	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	14日
10035-00	オブジーボ (480/body)q4w MSI-high大腸癌	オブジーボ点滴静注	480	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	28日
10036-00	キイトルダ (200/body) q3w MSI-high大腸癌	キイトルダ点滴静注	200	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	21日
10037-00	キイトルダ (400/body) q6w MSI-high大腸癌	キイトルダ点滴静注	400	ミグ ラム	点滴静注	Day 1	42日
10038-00	biweekly アービタックス(500) q2w 大腸癌	アービタックス注射液	500	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
10039-00	アービタックス(初回)+ヒラフトピカプセル q1w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	400	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	7日
		ピラフトピカプセル	300	ミグ ラム	内服	Day 1-7	
		メクトビ錠	45	ミグ ラム × 2	内服	Day 1-7	
10039-01	アービタックス(2回目以降)+ヒラフトピカプセル q1w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	250	ミグ ラム/㎡	点滴静注	Day 1	7日
		ピラフトピカプセル	300	ミグ ラム	内服	Day 1-7	
		メクトビ錠	45	ミグ ラム × 2	内服	Day 1-7	

10041-00	トラスツズマブ BS(8/kg)+パニツチニ(840/body) 初回 q3w 大腸癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	8	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パニツチニ点滴静注	840	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
10041-01	トラスツズマブ BS(6/kg)+パニツチニ(420/body) 2回目以降 q3w 大腸癌	トラスツズマブ B S 点滴静注用	6	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		パニツチニ点滴静注	420	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
10042-00	【3週ごと】 TEGAFOX q3w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		ユーエフティ	300	ミリグラム/㎡	内服	Day 1-14	
		ロイコボリン	75	ミリグラム	内服	Day 1-14	
10045-00	2週毎7-ヒトタックス+ビラフトビ内服 q2w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	500	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		ビラフトビカプセル	300	ミリグラム	内服	Day 1-14	
10046-00	2週毎7-ヒトタックス+ビラフトビ+メクトビ内服 q2w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	500	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		ビラフトビカプセル	300	ミリグラム	内服	Day 1-14	
		メクトビ錠	45	ミリグラム×2	内服	Day 1-14	
10047-00	ベクテビックス(6/kg)+ルマケラス内服 q2w KRAS G12C変異あり 大腸癌	ベクテビックス点滴静注	6	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		ルマケラス錠	960	ミリグラム	内服	Day 1-14	
10048-00	mFOLFOX6+2週毎7-ヒトタックス(500)+ビラフトビ内服 q2w BRAF変異あり 大腸癌	アービタックス注射液	500	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		レポホリナート点滴静注用	200	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		オキサリプラチン点滴静注液	85	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	400	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		フルオロウラシル注	2400	ミリグラム/㎡	持続注入	Day 1-2	
		ビラフトビカプセル	300	ミリグラム	内服	Day 1-14	
70096-00	PRABITAS 【従来】 : ロンサーフ(d1タ-d6朝 d8タ-d13朝内服) パニツチニ(5/kg) d1 15 q4w 大腸癌	ロンサーフ	35	ミリグラム/㎡×2	内服	Day 1-5, 8-12	28日
		ペバシズマブ B S 点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 15	
70097-00	PRABITAS 【隔週】 : ロンサーフ(d1タ-d6朝内服) パニツチニ(5/kg) d1 q2w 大腸癌	ロンサーフ	35	ミリグラム/㎡×2	内服	Day 1-5	14日
		ペバシズマブ B S 点滴静注	5	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	