

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(130) q3w大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	エスワン配合OD錠	80	mg/m ²	内服	Day 1-14		
SOX S-1(内服 d1-14)+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	ベハシマブBS注	7.5	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	エスワン配合OD錠	80	mg/m ²	内服	Day 1-14		
XELOX カヘシタヒン内服 d1-14+L-OHP(130) q3w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	カヘシタヒン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	mg/m ² ×2	内服	Day 1-14		
XELOX+BEV カヘシタヒン内服d1-14+L-OHP(130)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	ベハシマブBS注	7.5	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	カヘシタヒン錠(1回用量をC法に基づき算出)	1000	mg/m ² ×2	内服	Day 1-14		
mFOLFOX6 5-FU(400/2400)+L-OHP(85)+LV(200) q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
mFOLFOX6+BEV 5-FU+L-OHP+LV+BEV q2w 大腸癌	ベハシマブBS注	5	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
mFOLFOX6+ベクティビックス q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	ベクティビックス注:静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
mFOLFOX6+2週毎アピタックス(500) q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	アピタックス注	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
TEGAFOX q3w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	ユーエフティ	300	mg/m ²	内服	Day 1-14		
	ロイコポリン	75	mg	内服	Day 1-14		
TEGAFOX q5w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15	35日	大腸癌
	ユーエフティ	300	mg/m ²	内服	Day 1-28		
	ロイコポリン	75	mg	内服	Day 1-28		
SIR S-1(内服 d1-14)+CPT-11(150) q3w大腸癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	エスワン配合OD錠	80	mg/m ²	内服	Day 1-14		
SIR+BEV S-1(内服 d1-14)+CPT-11(150)+BEV(7.5/kg) q3w大腸癌	ベハシマブBS注	7.5	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	エスワン配合OD錠	80	mg/m ²	内服	Day 1-14		
FOLFIRI原法 q2w 大腸癌	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
FOLFIRI原法+BEV(5/kg) q2w 大腸癌	ベハシマブBS注	5	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
FOLFIRI原法+ベクティビックス(6/kg) q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	ベクティビックス注:静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオロウラシル注	400	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
XELIRI+BEV q3w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	21日	大腸癌
	ベハシマブBS注	7.5	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
FOLFIRI3 q2w 大腸癌	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		
	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
FOLFIRI3+BEV q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	ベハシマブBS注	5	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		
FOLFIRI3+ベクティビックス q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	ベクティビックス注:静注用	6	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		
FOLFIRI3+2週毎アピタックス(500) q2w 大腸癌	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²	持続注入	Day 1-2	14日	大腸癌
	アピタックス注	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		

sLV5FU2+BEV q2w 大腸癌	ベハシマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	400 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	2400 mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
FOLFOX"IRI"+ジ'-ラスタ q2w 大腸癌	オキサリプラチン点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	165 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	3000 mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
	ジーラスタ皮下注	3.6 mg	皮下注	Day4		
FOLFOX"IRI"+BEV+ジ'-ラスタ q2w 大腸癌	ベハシマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	オキサリプラチン点滴静注液	85 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	165 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	3000 mg/m ²	持続注入	Day 1		
FOLFIRI原法+ザ'ムラップ q2w 大腸癌	ザ'ムラップ点滴静注	4 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	400 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	2400 mg/m ²	持続注入	Day 1		
FOLFIRI3+ザ'ムラップ q2w 大腸癌	ザ'ムラップ点滴静注	4 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		
	フルオウラシル注	2400 mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
FOLFIRI原法+サイラムサ' 大腸癌 2コース以降	サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	400 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	フルオウラシル注	2400 mg/m ²	持続注入	Day 1-2		
FOLFIRI3+サイラムサ' 大腸癌	サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
	レボホリナート注:点静用	200 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 3		
	フルオウラシル注	2400 mg/m ²	持続注入	Day 1		
ア-ビ'タックス(初回 400)+CPT-11(150) 大腸癌	ア-ビ'タックス注(初回)	400 mg/m ²	点滴静注	Day 1	49日	大腸癌
	ア-ビ'タックス注	250 mg/m ²	点滴静注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15, 29		
ア-ビ'タックス(2コース目以降 250)+CPT-11(150) 大腸癌	ア-ビ'タックス注	250 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43	49日	大腸癌
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15, 29		
ベク'ティ'ビ'ックス(6/kg)単剤 q2w 大腸癌	ベク'ティ'ビ'ックス注:静注用	6 mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
biweekly ア-ビ'タックス(500) q2w 大腸癌	ア-ビ'タックス注	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
カベシ'タ'ヒ'ン(1250/m ² ×2 day1-14)+BEV(7.5/kg) q3w 大腸癌	ベハシマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	カベシ'タ'ヒ'ン錠(1回用量をB法に基づき算出)	1250 mg/m ²	内服	Day 1-14		
UFT(300 day1-21)+LV+BEV(5/kg day1 15) q4w 大腸癌	ベハシマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	大腸癌
	ユー-エフティ	300 mg/m ²	内服	Day 1-21		
ロンサ-フ(内服) d1-5 8-12 ベハシマブ(5/kg) d1 15 q4w 大腸癌	ベハシマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	Day 1, 15	28日	大腸癌
	ロンサ-フ	35 mg/m ²	内服	Day 1-5, 8-12		
オブジ-ホ'(240/body)q2w MSI-high大腸癌	オブジ-ホ'点滴静注	240 mg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
オブジ-ホ'(480/body)q4w MSI-high大腸癌	オブジ-ホ'点滴静注	480 mg	点滴静注	Day 1	28日	大腸癌
オブジ-ホ'(240/body)+ヤ-ホ'イ(1/kg) q3w MSI-high大腸癌	オブジ-ホ'点滴静注	240 mg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
	ヤ-ホ'イ点滴静注液	1 mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジ-ホ'(240/body)維持q2w Nivo+ipi→Nivo MSI-High大腸癌	オブジ-ホ'点滴静注	240 mg	点滴静注	Day 1	14日	大腸癌
キイトルーダ'(200/body) q3w MSI-high大腸癌	キイトルーダ'点滴静注	200 mg	点滴静注	Day 1	21日	大腸癌
キイトルーダ'(400/body) q6w MSI-high大腸癌	キイトルーダ'点滴静注	400 mg	点滴静注	Day 1	42日	大腸癌
ア-ビ'タックス+ピラフ'ヒ'+メク'ト'ビ' q1w BRAF 変異あり 大腸癌	ア-ビ'タックス注(初回)	400 mg/m ²	点滴静注	Day 1	7日	大腸癌
	ア-ビ'タックス注(2回目以降)	250 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	ピラフ'ヒ'カプセル	300 mg	内服	連日		
	メク'ト'ビ'錠	45 mg×2	内服	連日		
FP+RT【5-FU(500)+CDDP(7)】d1-5 22-26 q6w 肛門扁平上皮癌	シスプラチン注マルコ	7 mg/m ²	点滴静注	Day 1-5, 22-26	42日	大腸癌
	フルオウラシル注	500 mg/m ²	点滴静注	Day 1-5, 22-26		