

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
DTIC(1000) q3-4w 悪性黒色腫	ダカルバジン注	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	悪性黒色腫
オブジーホ(240/body) q2w 悪性黒色腫	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	悪性黒色腫
オブジーホ(480/body)q4w 悪性黒色腫	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	悪性黒色腫
キイトルーダ(200/body) q3w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	悪性黒色腫
キイトルーダ(400/body) q6w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	400	mg	点滴静注	Day 1	42日	悪性黒色腫
ヤーホイ(3/kg) q3w 悪性黒色腫	ヤーホイ点滴静注液	3	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	悪性黒色腫
オブジーホ(80/body)+ヤーホイ(3/kg) q3w 悪性黒色腫	オブジーホ点滴静注	80	mg	点滴静注	Day 1	21日	悪性黒色腫
	ヤーホイ点滴静注液	3	mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジーホ(240/body)維持療法(nivo+ipiから切替え)q2w 悪性黒色腫	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	悪性黒色腫
オブジーホ(480/body)維持q4w(Nivo+ipi→Nivo単剤)悪性黒色腫	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	悪性黒色腫
パベンチオ(10/kg) q2w メルケル細胞癌	パベンチオ点滴静注	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	メルケル細胞癌