

バスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
12001-00	オプジーボ (240/body) q2w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
12002-00	オプジーボ (480/body)q4w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
12003-00	キイトルーダ (200/body) q3w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
12004-00	キイトルーダ (400/body) q6w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
12005-00	ヤーボイ (3/kg) q3w 悪性黒色腫	ヤーボイ点滴静注液	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
12006-00	オプジーボ (80/body)+ヤーボイ (3/kg) q3w 悪性黒色腫	ヤーボイ点滴静注液	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
		オプジーボ点滴静注	80	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
12006-01	オプジーボ (240/body)維持療法(nivo+ipiから切替え)q2w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
12007-00	オプジーボ (480/body)維持q4w(Nivo+Ipi→Nivo単剤)悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
12008-00	DTIC(1000) q3-4w 悪性黒色腫	ダカルバジン注	1000	ミリグラム/m ²	点滴静注	Day 1	28日
12009-00	バベンチオ(10/kg) q2w メルケル細胞癌	バベンチオ点滴静注	10	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
12010-00	オプジーボ (240/body) q2w 進行・再発 上皮系皮膚悪性腫瘍	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
12011-00	オプジーボ (480/body)q4w 進行・再発 上皮系皮膚悪性腫瘍	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日