レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
オプジーボ (240/body) q2w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
オプジーボ (480/body)q4w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
キイトルーダ (200/body) q3w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
キイトルーダ (400/body) q6w 悪性黒色腫	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
ヤーボイ(3/kg) q3w 悪性黒色腫	ヤーボイ点滴静注液	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
オプジーボ (80/body)+ヤーボイ(3/kg) q3w 悪性黒色腫	ヤーボイ点滴静注液	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	21日
	オプジーボ点滴静注	80	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
オプジーボ (240/body)維持療法(nivo+ipiから切替え)q2w 悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
オプジーボ (480/body)維持q4w(Nivo+Ipi→Nivo単剤)悪性黒色腫	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
DTIC(1000) q3-4w 悪性黒色腫	ダカルバジン注	1000	ミリグラム/m ²	点滴静注	Day 1	28日
オプジーボ 単剤3ミリグラム/kg q2w 【倫理】 悪性黒色腫[術後補助]	オプジーボ点滴静注	3	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
バベンチオ(10/kg) q2w メルケル細胞癌	バベンチオ点滴静注	10	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日