

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
DTX(70) q3w 前立腺癌	ドセタキセル注	70	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	前立腺癌
CBZ(25)(+PEG G-CSF) q3w 前立腺癌	ジェブテナ点滴静注	25	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	前立腺癌
	ジーラスタ皮下注	3.6	mg	皮下注			
GEM(1000)day1 8 15+CBDC(AUC:5)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	尿路上皮癌
	カルボプラチン注NK	5	AUC	点滴静注	Day 2		
GEM(1000)day1 8 15+CDDP(70)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	尿路上皮癌
	シスプラチン注マルコ	70	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
パベンチオ(10/kg)q2w+インライタ(po 5mg×2) 腎細胞癌	パベンチオ点滴静注	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	腎細胞癌
オブジーホ(240/body) q2w 腎細胞癌	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	腎細胞癌
オブジーホ(240/body)+ヤーホイ(1/kg) q3w 腎細胞癌	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	21日	腎細胞癌
	ヤーホイ点滴静注液	1	mg/kg	点滴静注	Day 1		
オブジーホ+ヤーホイ+オブジーホ(240/body)維持療法 q2w 腎細胞癌	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	腎細胞癌
キイトルーダ(200/body)+インライタ(5mg×2 内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	腎細胞癌
	インライタ錠	5	mg×2	内服	連日		
キイトルーダ(200/body) q3w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	尿路上皮癌
キイトルーダ(400/body)+インライタ(5mg×2 内服・連日) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	mg	点滴静注	Day 1	42日	腎細胞癌
	インライタ錠	5	mg×2	内服	連日		
キイトルーダ(400/body) q6w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	400	mg	点滴静注	Day 1	42日	尿路上皮癌
オブジーホ(480/body) q4w 腎細胞癌	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	腎細胞癌
オブジーホ(480/body)維持q4w(Nivo+ipi→Nivo単剤)腎細胞癌	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	腎細胞癌
THP(30/body) q1w 膀胱内注入 膀胱癌	テラルピシン注	30	mg	膀胱内注入	Day 1	7日	膀胱癌
パベンチオ(10/kg) 化学療法後の維持療法 q2w 尿路上皮癌	パベンチオ点滴静注	10	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	尿路上皮癌
MVAC(MTX+VBL+EPI+CDDP)q4w 尿路上皮癌	メトレキセート注	30	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15, 22	28日	尿路上皮癌
	エクザール注	3	mg/m ²	点滴静注	Day 2, 15, 22		
	エビルピシン塩酸塩注	30	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 2		
	シスプラチン注マルコ	70	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
PTX(180)d1+GEM(1000)d1 8 15 q4w 尿路上皮癌	パクリタキセル注	180	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	尿路上皮癌
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
M-VECA(MTX+VBL+EPI+CBDC)q4w 尿路上皮癌	メトレキセート注	30	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15, 22	28日	尿路上皮癌
	エクザール注	3	mg/m ²	点滴静注	Day 2, 15, 22		
	エビルピシン塩酸塩注	50	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 2		
	カルボプラチン注NK	4	AUC	点滴静注	Day 2		
CDDP(100)day1+5FU(1000)day1-5 q3-4w 陰茎癌	シスプラチン注マルコ	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	陰茎癌
	フルオロウラシル注	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1-5		
オブジーホ(240/body)d1+カホサンチニブ(40mg/day 内服)連日 q2w 腎癌	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	腎癌
	カホメティクス錠	40	mg/day	内服	連日		
オブジーホ(480/body)d1+カホサンチニブ(40mg/day 内服)連日 q4w 腎癌	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	腎癌
	カホメティクス錠	40	mg/day	内服	連日		
dose-dense MVAC q2w 尿路上皮癌	メトレキセート注	30	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	尿路上皮癌
	エクザール注	3	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
	ドキシソルピシン塩酸塩注	30	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 2		
	シスプラチン注マルコ	70	mg/m ²	点滴静注	Day 2		
ハドセブ(1.25/kg) day1 8 15 q4w 尿路上皮癌	ハドセブ点滴静注用	1.25	mg/kg	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	尿路上皮癌
キイトルーダ(200/body)+レンパチニブ(20mg/day 連日内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	mg	点滴静注	Day 1	21日	腎細胞癌
	レンピマカプセル	20	mg	連日			
キイトルーダ(400/body)+レンパチニブ(20mg/day 連日内服) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	mg	点滴静注	Day 1	42日	腎細胞癌
	レンピマカプセル	20	mg	連日			
オブジーホ(240/body)術後 q2w 尿路上皮癌(投与期間12ヶ月まで)	オブジーホ点滴静注	240	mg	点滴静注	Day 1	14日	尿路上皮癌
オブジーホ(480/body)術後 q4w 尿路上皮癌(投与期間12ヶ月まで)	オブジーホ点滴静注	480	mg	点滴静注	Day 1	28日	尿路上皮癌