

パスコード	レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
13001-00	オプジーボ (240/body) q2w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
13002-00	オプジーボ (480/body) q4w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
13003-00	オプジーボ (240/body)+ヤーボイ(1/kg) q3w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		ヤーボイ点滴静注液	1	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	
13003-01	オプジーボ+ヤーボイ→オプジーボ (240/body)維持療法 q2w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
13004-00	オプジーボ (480/body)維持q4w(Nivo+Ipi→Nivo単剤)腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
13005-00	キイトルーダ (200/body)+インライタ(5ミリグラム×2 内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		インライタ錠	5	ミリグラム×2	内服	連日	
13006-00	キイトルーダ (400/body)+インライタ(5ミリグラム×2内服・連日) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
		インライタ錠	5	ミリグラム×2	内服	連日	
13007-00	バベンチオ(10/kg)q2w+インライタ(po 5ミリグラム×2) 腎細胞癌	バベンチオ点滴静注	10	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
		インライタ錠	5	ミリグラム×2	内服	連日	
13008-00	オプジーボ (240/body)d1+カボサチニブ (40ミリグラム/day 内服)連日 q2w 腎癌	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
		カボメティクス錠	40	ミリグラム/day	内服	連日	
13009-00	オプジーボ (480/body)d1+カボサチニブ (40ミリグラム/day 内服)連日 q4w 腎癌	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
		カボメティクス錠	40	ミリグラム/day	内服	連日	
13010-00	キイトルーダ (200/body)+レンビマチニブ (20ミリグラム/day 連日内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		レンビマカプセル	20	ミリグラム/day	内服	連日	
13011-00	キイトルーダ (400/body)+レンビマチニブ (20ミリグラム/day 連日内服) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
		レンビマカプセル	20	ミリグラム/day	内服	連日	
13012-00	キイトルーダ (200/body) q3w 【12ヶ月間】 腎細胞癌 術後	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
13013-00	キイトルーダ (400/body) q6w 【12ヶ月間】 腎細胞癌 術後	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
13014-00	オプジーボ (240/body)術後 q2w 尿路上皮癌 (投与期間12ヶ月まで)	オプジーボ点滴静注	240	ミリグラム	点滴静注	Day 1	14日
13015-00	オプジーボ (480/body)術後 q4w 尿路上皮癌 (投与期間12ヶ月まで)	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
13016-00	キイトルーダ (200/body) q3w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
13017-00	キイトルーダ (400/body) q6w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
13018-00	GEM(1000)day1 8 15+CDDP(70)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2	
13019-00	GEM(1000)day1 8+CDDP(70)day2 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2	
13020-00	GEM(1000)day1 8 15+CBDC(AUC:5)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 2	
13021-00	GEM(1000)day1 8+CBDC(AUC:5)day2 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 2	

13022-00	パベンチオ(10/kg) 化学療法後の維持療法 q2w 尿路上皮癌	パベンチオ点滴静注	10	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1	14日
13023-00	パドセブ (1.25/kg) day1 8 15 q4w 尿路上皮癌	パドセブ点滴静注用	1.25	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
13024-00	THP(30/body) q1w 膀胱内注入 膀胱癌	テラルピシン注射用	30	ミリグラム	膀胱内注入	Day 1	7日
13025-00	MVAC(MTX+VBL+EPI+CDDP)q4w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1,15, 22	28日
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2, 15, 22	
		エピルピシン塩酸塩注射用	30	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 2	
		エクザール注射用	3	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2	
13026-00	M-VECa(MTX+VBL+EPI+CBDCa)q4w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1,15, 22	28日
		エクザール注射用	3	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2, 15, 22	
		エピルピシン塩酸塩注射用	50	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 2	
		カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	点滴静注	Day 2	
13027-00	dose-dense MVAC q2w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	14日
		エクザール注射用	3	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2	
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 2	
		ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 2	
13028-00	PTX(180)d1+GEM(1000)d1 8 15 q4w 尿路上皮癌	パクリタキセル点滴静注液	180	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	28日
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
13029-00	CDDP(100)day1+5FU(1000)day1-5 q3-4w 陰茎癌	シスプラチン点滴静注	100	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	28日
		フルオロウラシル注	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
13030-00	DTX(70) q3w 前立腺癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
13031-00	DTX(70)+ドクタド (600ミリグラム×2 連日内服)+ADT q3w 前立腺癌	ドセタキセル点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		ニューベクオ錠	600	ミリグラム×2	内服	連日	
13032-00	CBZ(25)(+PEG G-CSF) q3w 前立腺癌	ジェブタナ点滴静注	25	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
		ベグフィルグラスチム皮下注	3.6	ミリグラム	皮下注	Day 2以降	
13033-00	パドセブ (1.25/kg)d1 8+キイトルーダ (200) q3w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	200	ミリグラム	点滴静注	Day 1	21日
		パドセブ点滴静注用	1.25	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 8	
13034-00	パドセブ (1.25/kg)d1 8 22 29+キイトルーダ (400) q6w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	400	ミリグラム	点滴静注	Day 1	42日
		パドセブ点滴静注用	1.25	ミリグラム/kg	点滴静注	Day 1, 8, 22, 29	
13035-00	GEM(1000)d1 8+CDDP(70)d1+オプジーボ d1 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		オプジーボ点滴静注	360	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
13036-00	オプジーボ (480/body) 化学療法後の維持療法 q4w 尿路上皮癌	オプジーボ点滴静注	480	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日
13037-00	GEM(1000)d1 8+CBDCa(AUC:5)d1+オプジーボ d1 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 1	
		オプジーボ点滴静注	360	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
13038-00	GEM(1000)d1 8+CDDP(70)d1+イミフィンジ d1 q3w 周術期(術前4cycle) 膀胱癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
		シスプラチン点滴静注	70	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	
		イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	
13039-00	イミフィンジ (1500/body) q4w 周術期(術後8cycle) 膀胱癌	イミフィンジ点滴静注	1500	ミリグラム	点滴静注	Day 1	28日