2024年10月作成
千葉大学医学部附属病院

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body) q2w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body) q4w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)+ﾔｰﾎﾞｲ(1/kg) q3w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	ヤーボイ点滴静注液	1	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ→ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)維持療法 q2w 腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body)維持q4w(Nivo+Ipi→Nivo単剤)腎細胞癌	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body)+ｲﾝﾗｲﾀ(5ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2 内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	インライタ錠	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400/body)+ｲﾝﾗｲﾀ(5ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2内服・連日) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
	インライタ錠	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
バベンチオ(10/kg)q2w+ｲﾝﾗｲﾀ(po 5ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2) 腎細胞癌	バベンチオ点滴静注	10	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
	インライタ錠	5	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)d1+ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞ(40ﾐﾘｸﾞﾗﾑ 内服)連日 q2w 腎癌	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
	カボメティクス錠	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body)d1+ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞ(40ﾐﾘｸﾞﾗﾑ 内服)連日 q4w 腎癌	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
	カボメティクス錠	40	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body)+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ(20ﾐﾘｸﾞﾗﾑ 連日内服) q3w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
	レンビマカプセル	20	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400/body)+ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ(20ﾐﾘｸﾞﾗﾑ 連日内服) q6w 腎細胞癌	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
	レンビマカプセル	20	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	内服	連日	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w 【12ヶ月間】 腎細胞癌 術後	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400/body) q6w 【12ヶ月間】 腎細胞癌 術後	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240/body)術後 q2w 尿路上皮癌 (投与期間12ヶ月まで)	オプジーボ点滴静注	240	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480/body)術後 q4w 尿路上皮癌 (投与期間12ヶ月まで)	オプジーボ点滴静注	480	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	28日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(200/body) q3w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	200	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	21日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(400/body) q6w 尿路上皮癌	キイトルーダ点滴静注	400	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	点滴静注	Day 1	42日
GEM(1000)day1 8 15+CDDP(70)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
	シスプラチン点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
GEM(1000)day1 8+CDDP(70)day2 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
	シスプラチン点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
GEM(1000)day1 8 15+CBDCA(AUC:5)day2 q4w 尿路上皮癌	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 2	

GEM(1000)day1 8+CBDCA(AUC:5)day2 q3w 尿路上皮癌	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC	点滴静注	Day 2	
ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ(10/kg) 化学療法後の維持療法 q2w 尿路上皮癌	バベンチオ点滴静注	10	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1	14日
ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ (1.25/kg) day1 8 15 q4w 尿路上皮癌	パドセブ点滴静注用	1.25	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/kg	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
THP(30/body) q1w 膀胱内注入 膀胱癌	テラルビシン注射用	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	膀胱内注入	Day 1	7日
MVAC(MTX+VBL+EPI+CDDP)q4w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1,15, 22	28日
	シスプラチン点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2, 15, 22	
	エピルビシン塩酸塩注射用	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ力価/㎡	点滴静注	Day 2	
	エクザール注射用	3	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
M-VECa(MTX+VBL+EPI+CBDCA)q4w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1,15, 22	28日
	エクザール注射用	3	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2, 15, 22	
	エピルビシン塩酸塩注射用	50	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ力価/㎡	点滴静注	Day 2	
	カルボプラチン点滴静注液	4	AUC	点滴静注	Day 2	
dose-dense MVAC q2w 尿路上皮癌	メソトレキセート注	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	14日
	エクザール注射用	3	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
	シスプラチン点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 2	
	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ力価/㎡	点滴静注	Day 2	
PTX(180)d1+GEM(1000)d1 8 15 q4w 尿路上皮癌	パクリタキセル点滴静注液	180	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	ゲムシタビン点滴静注用	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	
CDDP(100)day1+5FU(1000)day1-5 q3-4w 陰茎癌	シスプラチン点滴静注	100	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	28日
	フルオロウラシル注	1000	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
DTX(70) q3w 前立腺癌	ドセタキセル点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
DTX(70)+ﾀﾞﾛﾙﾀﾐﾄﾞ (600ﾐﾘｸﾞﾗﾑx2 連日内服)+ADT q3w 前立腺癌	ドセタキセル点滴静注	70	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	ニュベクオ錠	600	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ×2	内服	連日	
CBZ(25)(+PEG G-CSF) q3w 前立腺癌	ジェブタナ点滴静注	25	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/㎡	点滴静注	Day 1	21日
	ジーラスタ皮下注	3.6	ﾐﾘｸﾞﾗﾑ	皮下注	Day 2以降	