

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
bi-weekly ActD(1.25) q2w 絨毛性疾患	コスメゲン注	1.25	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	14日	絨毛癌
ActD(0.5mg/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	コスメゲン注	0.5	mg(力価)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	絨毛癌
MTX(20mg/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	メトレキセート注	20	mg	筋注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	絨毛癌
ETP(100mg/body) day1-5 q2w 絨毛性疾患	エトポシド注・点静用	100	mg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	絨毛癌
weekly CDDP(40)+RT 子宮頸癌	シスプラチン注マルコ	40	mg/m ²	点滴静注	Day 1	7日	子宮頸癌
CBDCA(AUC:6)+PTX(175) q3w 子宮頸癌	ハクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮頸癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC:6)+PTX(175)+アバシチン(15/kg) q3w 子宮頸癌	アバシチン注・点静用	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	子宮頸癌
	ハクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CDDP(60)d1+CPT-11(60)d1 8 15 q4w 子宮頸癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	27日	子宮頸癌
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CDDP(50)+PTX(175)+アバシチン(15/kg) q3w 子宮頸癌	アバシチン注・点静用	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	子宮頸癌
	ハクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	シスプラチン注マルコ	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CPT-11(100)単剤 day1 8 15 q4w 子宮頸癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	子宮頸癌
CBDCA(AUC:6)+PTX(175) q3w 子宮体癌	ハクリタキセル注	175	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
CDDP(50)+ADR(60) q3w 子宮体癌	ドキシソルビシン塩酸塩注	60	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
	シスプラチン注マルコ	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
DTX(70)+CDDP(60) q3w 子宮体癌	ドセタキセル注	70	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
DTX(70)+CBDCA(AUC:6) q3w 子宮体癌	ドセタキセル注	70	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
DTX(70) q3w 子宮体癌	ドセタキセル注	70	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
PTX(180)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	ハクリタキセル注	180	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
dose-dense wPTX(80)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	ハクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	卵巣癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
DTX(70)+CBDCA(AUC:6) q3w 卵巣癌	ドセタキセル注	70	mg/m ²	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1		
PLD(50) q4w 卵巣癌	ドキシル注	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	卵巣癌
CBDCA(AUC:5)+PLD(30) q4w 卵巣癌	ドキシル注	30	mg/m ²	点滴静注	Day 1	28日	卵巣癌
	カルボプラチン注NK	5	AUC	点滴静注	Day 1		
GEM(1000)単剤 day1 8 15 q4w 卵巣癌	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	卵巣癌
CPT-11(100)単剤 day1 8 15 q4w 卵巣癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	卵巣癌
CPT(50)d1 8+GEM(500)d1 8 (level 0) q3w 卵巣癌	イリテカン塩酸塩点滴静注液	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8	21日	卵巣癌
	ゲムシタピン点滴静注用	500	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
アバシチン(15mg/kg)単剤 maintenance q3w 卵巣癌	アバシチン注・点静用	15	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
weekly PTX(80) day1 8 15 q3w 卵巣癌	ハクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	卵巣癌
CCRT: daily CDDP(8) 5days 子宮頸癌	シスプラチン注マルコ	8	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	5日	子宮頸癌
MEA d1-5 q2w 絨毛癌	メトレキセート注	300	mg	点滴静注	Day 1	14日	絨毛癌
	エトポシド注・点静用	100	mg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	コスメゲン注	0.5	mg(力価)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	メトレキセート注	150	mg	点滴静注	Day 1		
MEA(過敏症) d1-5 q2w 絨毛癌	エトポシド注・点静用	100	mg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	絨毛癌
	メトレキセート注	300	mg	点滴静注	Day 1		
	コスメゲン注	0.5	mg(力価)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	メトレキセート注	150	mg	点滴静注	Day 1		
EP/EMA q2w 絨毛癌	エトポシド注・点静用	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1	14日	絨毛癌
	シスプラチン注マルコ	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	エトポシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 8		
	メトレキセート注	300	mg/m ²	点滴静注	Day 8		
TP/TE q4w 絨毛癌	ハクリタキセル注	135	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15	28日	絨毛癌
	シスプラチン注マルコ	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
wPTX(80)d1 8 15+wCBDCA(AUC2)d1 8 15 q3w 卵巣癌	エトポシド注・点静用	150	mg/m ²	点滴静注	Day 15	21日	卵巣癌
	ハクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
weekly【PTX(80)+CBDCA(AUC2)】+アバシチン(15/kg)d1 q3w 卵巣癌	カルボプラチン注NK	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	卵巣癌
	アバシチン注・点静用	15	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	ハクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
PTX(180)+CBDCA(AUC:6)+アバシチン(15/kg) q3w 卵巣癌	カルボプラチン注NK	2	AUC	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	卵巣癌
	アバシチン注・点静用	15	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	ハクリタキセル注	180	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
wPTX(80)d1 8 15+wCDDP(25)d1 8 15 q3-4w 卵巣癌	カルボプラチン注NK	6	AUC	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
	ハクリタキセル注	80	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
シスプラチン注マルコ	シスプラチン注マルコ	25	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	卵巣癌

weekly CDDP(40)+RT 腫瘍	シスプラチン注マルコ	40 mg/m ²	点滴静注	Day 1	7日	腫瘍
5-FU(1500/body days1-5)+ActD(0.5/body day1-5) q2w 絨毛癌	コスメゲン注	0.5 mg(力価)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	絨毛癌
	フルオウラシル注	1500 mg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	フルオウラシル注	1500 mg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
PLD(50)+アハスチン(15/kg) q4w 卵巣癌	アバサチン注:点静用	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	28日	卵巣癌
	ドキシル注	50 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDCA(AUC:5)+PLD(30)+アハスチン(15/kg) q4w 卵巣癌	アバサチン注:点静用	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	28日	卵巣癌
	ドキシル注	30 mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	カルボプラチン注NK	5 AUC	点滴静注	Day 1		
dose-dense wPTX(80)+CBDCA(AUC:6)+アハスチン(15/kg) q3w 卵巣癌	アバサチン注:点静用	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
	ハクシキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
	カルボプラチン注NK	6 AUC	点滴静注	Day 1		
Low dose EP(ETP+CDDP) q1w 絨毛癌	エトポシド注:点静用	100 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2	7日	絨毛癌
	シスプラチン注マルコ	20 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2		
wPTX(80)+wCDDP(25)+アハスチン(15/kg) q3w 卵巣癌	アバサチン注:点静用	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
	ハクシキセル注	80 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
	シスプラチン注マルコ	25 mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8, 15		
BEV(15mg/kg)+LYN(600mg/日) maintenance q3w 卵巣癌	アバサチン注:点静用	15 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	卵巣癌
キイトルーダ(200/body)+レンハチニブ(20mg/day 連日内服) q3w 子宮体癌	キイトルーダ点滴静注	200 mg	点滴静注	Day 1	21日	子宮体癌
	レンピマカプセル	20 mg	内服	連日		