

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
BEP【BLM(30/body)d2 9 16+(ETP100+CDDP20)d1-5】q3w胚細胞腫瘍	プレオ注射用	30	mg(力価)	点滴静注	Day 2, 9, 16	21日	胚細胞腫瘍
	エトポシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	シスプラチン注マルコ	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
EP(ETP100+CDDP20)d1-5 q3w 胚細胞腫瘍	エトポシド注・点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マルコ	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	エトポシド注・点静用	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
VIP(ETP:75+IFO:1200+CDDP:20+mesna)day1-5 q3w 胚細胞腫瘍	イホマド注	1200	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マルコ	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	エクザール注	0.11	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2		
VelP【VBL:0.11/kg d1 2+(IFO:1200+CDDP:20)d1-5】q3w胚細胞腫瘍	イホマド注	1200	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マルコ	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	ハクシタキセル注	250	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
TIP【PTX:250 d1+(IFO:1500+CDDP:25)d2-5】q3w胚細胞腫瘍	イホマド注	1500	mg/m ²	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5	21日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マルコ	25	mg/m ²	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5		
	イホマド注	900	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
ICE(IFO:900+CDDP:20+ETP:60)d1-5 q6w 頭蓋内原発胚細胞腫瘍	エトポシド注・点静用	60	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	42日	胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マルコ	20	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15		
NDP(100)day1+CPT-11(100)day1 15 q4w 胚細胞腫瘍	イリテカン塩酸塩点滴静注液	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 15	28日	胚細胞腫瘍
	アクブラ注	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
CBDC(AUC:7) day1 q3w 胚細胞腫瘍	カルボプラチン注NK	7	AUC	点滴静注	Day 1	21日	胚細胞腫瘍