

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
DXR(75) q3w 悪性軟部肉腫	ドキソルビシン塩酸塩注	75	mg(力価)/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	悪性軟部肉腫
DXR(30)d1 2+IFO(2000)d1-5 q3w 悪性軟部肉腫	ドキソルビシン塩酸塩注	30	mg(力価)/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 2	21日	悪性軟部肉腫
	イホマイド注	2000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
Trabectedin(1.2) q3w 悪性軟部肉腫	ヨンデリス点滴静注用	1.2	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1	21日	悪性軟部肉腫
eribulin(1.4)d1 8 q3w 悪性軟部肉腫	ハラヴェン静注	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8	21日	悪性軟部肉腫
PTX(80)d1 8 15 q4w 血管肉腫	パクリタセル注	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日	悪性軟部肉腫
VAC2.2[VCR(1.5)+ActD(0.045/kg)+CPA(2200)] q3w 横紋筋肉腫	オンコピン注	1.5	mg/m <sup>2</sup> (最大2mg)	点滴静注	Day 1, 8, 15	21日	横紋筋肉腫
	エンドキサン注	2200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	コスメゲン注	0.05	mg/kg	点滴静注	Day 1		
VDC/IE VDC(VCR2+DXR75+CPA1200)q3w ユーイング肉腫	オンコピン注	2	mg	点滴静注	Day 1	21日	ユーイング肉腫
	ドキソルビシン塩酸塩注	75	mg(力価)/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
	エンドキサン注	1200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1		
VDC/IE IE【IFO(1800)+ETP(100)】D1-5 q3w ユーイング肉腫	エトボシド注 点静用	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	ユーイング肉腫
	イホマイド注	1800	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		