

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール
DXR(60) q3w 悪性軟部肉腫	ドキソルビシン塩酸塩注射用	60	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
DXR(75) q3w 悪性軟部肉腫	ドキソルビシン塩酸塩注射用	75	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1	21日
DXR(30)d1 2+IFO(2000)d1-5 q3w 悪性軟部肉腫	注射用イホマイド	2000	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日
	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30	ミリグラム力価/㎡	点滴静注	Day 1, 2	
eribulin(1.4)d1 8 q3w 悪性軟部肉腫	ハラヴェン静注	1.4	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8	21日
Trabectedin(1.2) q3w 悪性軟部肉腫	ヨンデリス点滴静注用	1.2	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1	21日
PTX(80)d1 8 15 q4w 血管肉腫	パクリタキセル点滴静注液	80	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 8, 15	28日
VDC/IE IE 【IFO(1800)+ETP(100)】 D1-5 q3w ユーイング 肉腫	エトボシド点滴静注液	100	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日
	注射用イホマイド	1800	ミリグラム/㎡	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	