

レジメン名	抗がん剤	用量	単位	投与経路	投与日	1クール	がん種
ネラピリン(1500)単剤 q3wk リンパ腫	アラノジン注	1500	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3, 5	21日	(小児)リンパ芽球性リンパ腫
ネラピリン(1500)単剤 q3wk 白血病	アラノジン注	1500	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3, 5	21日	(小児)リンパ性白血病
LCH-III 寛解導入1 wk1-6 組織球症 LR群	エクザール注	6	mg	管注	Day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日	(小児)ランゲルハンス細胞組織球症
	ブレドニン	40	mg/ml/日	内服	Day 1-28 →29-42(漸減)		
	エクザール注	6	mg	管注	Day 1		
LOH-III 維持療法7-ALR-6 q3wk wk7-25 組織球症 LR群	ブレドニン	40	mg/ml/日	内服	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)ランゲルハンス細胞組織球症
IT(CPT-11+TMZ)q3wk 最大6サイクル 神経芽腫	テモダール注・点滴静注用	100	mg/ml	点滴静注 or 内服	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)神経芽腫
	リリチン塩酸塩点滴静注液	10	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12		
TC(NGT+CPA)q3-4wk 神経芽腫(12kg≤BW)	ハイカムチン注	0.75	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)神経芽腫
	エンドキサン注	250	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
TC(NGT+CPA)q3-4wk 神経芽腫(BW<12kg)	ハイカムチン注	0.025	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)神経芽腫
	エンドキサン注	8.33	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
FLU(90)+TBI(12Gy) 移植前処置(HLA半合致移植)	フルダラ注	30	mg/ml	点滴静注	Day 7-11		(小児)造血幹細胞移植
アドセリス単剤 1.8mg/kg q3wk リンパ腫	アドセリス点滴静注用	1.8	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
PLADO(CDDP+DXR)q3wk 膀胱癌(10kg≤BW)	シスプラチン注マルコ	80	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日	(小児)膀胱癌
	ドキソルビシン塩酸塩注	30	mg(力価)/ml	中心(シリンジ)	Day 2, 3		
PLADO(CDDP+DXR)q3wk 膀胱癌(BW<10kg)	シスプラチン注マルコ	2.7	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	(小児)膀胱癌
	ドキソルビシン塩酸塩注	1	mg(力価)/kg	中心(シリンジ)	Day 2, 3		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(age<1歳)	コスマゲン注	0.0225	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43, 64	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.025	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(1歳≤年齢&BW<30kg)	コスマゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43, 64	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(30kg≤BW)	コスマゲン注	1.35	mg(力価)/m(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43, 64	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 12-18週(age<1歳)	コスマゲン注	0.0225	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43	49日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.0335	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 22, 43		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 12-18週(1歳≤年齢&BW<30kg)	コスマゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43	49日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.067	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 22, 43		
JWITS-2 Regimen EE-4A 腎腫瘍 術後 12-18週(30kg≤BW)	コスマゲン注	1.35	mg(力価)/m(最大2.3mg)	管注	Day 1, 22, 43	49日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 22, 43		
JWITS-2 Regimen DD-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(age<1歳)	コスマゲン注	0.0225	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 43	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.025	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
	ドキソルビシン塩酸塩注	0.75	mg(力価)/kg	点滴静注	Day 22, 64		
JWITS-2 Regimen DD-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(1歳≤年齢&BW<30kg)	コスマゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1, 43	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
	ドキソルビシン塩酸塩注	1.5	mg(力価)/kg	点滴静注	Day 22, 64		
JWITS-2 Regimen DD-4A 腎腫瘍 術後 0-10週(30kg≤BW)	コスマゲン注	1.35	mg(力価)/m(最大2.3mg)	管注	Day 1, 43	84日	(小児)腎腫瘍・Wilms腫瘍
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71		
	ドキソルビシン塩酸塩注	45	mg(力価)/ml	点滴静注	Day 22, 64		
JN-H-15 05A1 神経芽腫 HR群(180≤年齢&10kg≤BW)	エンドキサン注	1200	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日	(小児)神経芽腫
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1		
	テラルピシン注	40	mg/ml	点滴静注	Day 3		
	シスプラチン注マルコ	20	mg/ml	中心(シリンジ)	Day 1, 2, 3, 4, 5		
JN-H-15 05A1 神経芽腫 HR群(180≤年齢&BW<10kg)	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1	21日	(小児)神経芽腫
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1		
	テラルピシン注	1.33	mg/kg	点滴静注	Day 3		
	シスプラチン注マルコ	0.66	mg/kg	中心(シリンジ)	Day 1, 2, 3, 4, 5		
JN-H-15 05A3 q4wk 神経芽腫 HR群(180≤年齢&10kg≤BW)	エンドキサン注	1200	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2	21日	(小児)神経芽腫
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1		
	テラルピシン注	40	mg/ml	点滴静注	Day 3		
	シスプラチン注マルコ	20	mg/ml	中心(シリンジ)	Day 1, 2, 3, 4, 5		
JN-H-15 05A3 q4wk 神経芽腫 HR群(180≤年齢&BW<10kg)	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2	21日	(小児)神経芽腫
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1		
	テラルピシン注	1.33	mg/kg	点滴静注	Day 3		
	シスプラチン注マルコ	0.66	mg/kg	中心(シリンジ)	Day 1, 2, 3, 4, 5		
JN-H-15 05A4 q4wk 神経芽腫 HR群(180≤年齢&10kg≤BW)	カルボプラチン注NK	400	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2	21日	(小児)神経芽腫
	イホマイド注	1800	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
JN-H-15 05A4 q4wk 神経芽腫 HR群(180≤年齢&BW<10kg)	カルボプラチン注NK	16.6	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2	21日	(小児)神経芽腫
	イホマイド注	60	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	3.3	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	シスプラチン注マルコ	20	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
BEP(BLM+VP16+ODDP)q3wk 胚細胞腫瘍(1歳≤age)	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)胚細胞腫瘍
	プレオ注射用	15	mg(力価)/ml(最大30mg)	管注	Day 1		
BEP(BLM+VP16+ODDP)q3wk 胚細胞腫瘍(age<1歳)	シスプラチン注マルコ	0.7	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)胚細胞腫瘍
	エトボシド注 点静用	3	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	プレオ注射用	0.5	mg(力価)/kg(最大30mg)	管注	Day 1		
ALCL-99 コスP リンパ腫 全リスク群(10kg≤BW)	エンドキサン注	200	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2	5日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	メトトレキサート注	12	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	30	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
ALCL-99 コスP リンパ腫 全リスク群(BW<10kg)	エンドキサン注	133	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2	5日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	メトトレキサート注	8	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	20	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
ALCL-99 コスAM1/2/3 リンパ腫 SR7-Δ3/HR7-Δ3群(10kg≤BW)	イホマイド注	800	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	メトトレキサート注	3000	mg/ml	点滴静注	Day 1		
	キロサイド注	150	mg/ml(12時間毎)	点滴静注	Day 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 4, 5		
ALCL-99 コスAM1/2/3 リンパ腫 SR7-Δ3/HR7-Δ3群(BW<10kg)	イホマイド注	533	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	メトトレキサート注	2000	mg/ml	点滴静注	Day 1		
	キロサイド注	100	mg/ml(12時間毎)	点滴静注	Day 4, 5		
	エトボシド注 点静用	67	mg/ml	点滴静注	Day 4, 5		
ALCL-99 コスBM1/2/3 リンパ腫 SR7-Δ3/HR7-Δ3群(BW<10kg)	メトトレキサート注	2000	mg/ml	点滴静注	Day 1	14日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	エンドキサン注	133	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	ドキソルビシン塩酸塩注	17	mg(力価)/ml	点滴静注	Day 4, 5		
ALCL-99 コスBM1/2/3 リンパ腫 SR7-Δ3/HR7-Δ3群(10kg≤BW)	メトトレキサート注	3000	mg/ml	点滴静注	Day 1	14日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	エンドキサン注	200	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	ドキソルビシン塩酸塩注	25	mg(力価)/ml	点滴静注	Day 4, 5		
	エトボシド注 点静用	150	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
AML-12 寛解導入1A EOM 白血病 全リスク群(2歳≤age)	キロサイド注	200	mg/ml	中心(シリンジ)	Day 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	12日	(小児)骨髄性白血病
	ハートロン注	5	mg/ml	中心(シリンジ)	Day 6, 7, 8, 9, 10		
	メトトレキサート注	12	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	30	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		

AML-12 寛解導入1A EOM 白血病 全リスク群(1歳≦age<2歳)	エトボシド注 点静用	5 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	12日	(小児)骨髄性白血病
	キロサイド注	6.67 mg/kg	中心(シリン)	Day 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
	ノバルトロン注	0.17 mg/kg	中心(シリン)	Day 6, 7, 8, 9, 10		
	メトトレキセート注	8 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	20 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 寛解導入1A EOM 白血病 全リスク群(age<1歳)	エトボシド注 点静用	3.33 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	12日	(小児)骨髄性白血病
	キロサイド注	4.45 mg/kg	中心(シリン)	Day 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
	ノバルトロン注	0.11 mg/kg	中心(シリン)	Day 6, 7, 8, 9, 10		
	メトトレキセート注	6 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	15 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 寛解導入2 HCEI 白血病 全リスク群(2歳≦age)	キロサイド注	3000 mg/ml(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3	5日	(小児)骨髄性白血病
	エトボシド注 点静用	100 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イダマイシン注	10 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1		
	メトトレキセート注	12 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 寛解導入2 HCEI 白血病 全リスク群(age<2歳)	キロサイド注	100 mg/kg(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3	5日	(小児)骨髄性白血病
	エトボシド注 点静用	3.33 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イダマイシン注	0.33 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1		
	メトトレキセート注	8 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	20 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 強化療法2 HCEI 白血病 Non-CBF SR/(HR)群(2歳≦age)	キロサイド注	3000 mg/ml(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3	5日	(小児)骨髄性白血病
	エトボシド注 点静用	100 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イダマイシン注	10 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1		
	メトトレキセート注	12 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 強化療法2 HCEI 白血病 Non-CBF SR/(HR)群(age<2歳)	キロサイド注	100 mg/kg(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3	5日	(小児)骨髄性白血病
	エトボシド注 点静用	3.33 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イダマイシン注	0.33 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1		
	メトトレキセート注	8 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	20 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
AML-12 強化療法1/3 HOM 白血病 Non-CBF SR/(HR)群(2歳≦age)	キロサイド注	2000 mg/ml(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	5日	(小児)骨髄性白血病
	ノバルトロン注	5 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3		
	メトトレキセート注	12 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	66.67 mg/kg(12時間毎)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
AML-12 強化療法1/3 HOM 白血病 Non-CBF SR/(HR)群(age<2歳)	ノバルトロン注	0.17 mg/kg	中心(シリン)	Day 1, 2, 3	5日	(小児)骨髄性白血病
	メトトレキセート注	8 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	20 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 1		
	キロサイド注	1.5 mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
HL-14 OEPA q4wk 全2/4クルリンパ腫 全リスク群(男児・10kg≦BW)	エトボシド注 点静用	125 mg/ml	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
	エトボシド注 点静用	125 mg/ml	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6		
HL-14 OEPA q4wk 全2/4クルリンパ腫 全リスク群(男児・BW<10kg)	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
	エトボシド注 点静用	125 mg/ml	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6		
	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
HL-14 COPDAC q4wk 全2/4クルリンパ腫 IR/HR群(男児・10kg≦BW)	エンドキサン注	500 mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	オンコピン注	1.5 mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8		
	ダカルバジン注	250 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3		
	フレドニン	40 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
	エンドキサン注	500 mg/ml	点滴静注	Day 1, 8		
HL-14 COPDAC q4wk 全2/4クルリンパ腫 IR/HR群(男児・BW<10kg)	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	ダカルバジン注	250 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3		
	フレドニン	40 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
	オンコピン注	1.5 mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
HL-14 OPFA q4wk 全2/4クルリンパ腫 全リスク群(女児・10kg≦BW)	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	プロカルバジン	100 mg/ml/日	内服	Day 1-15		
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
HL-14 OPFA q4wk 全2/4クルリンパ腫 全リスク群(女児・BW<10kg)	プロカルバジン	100 mg/ml/日	内服	Day 1-15	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
	ドキシルビン塩酸塩注	40 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 15		
	フレドニン	60 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
	プロカルバジン	100 mg/ml/日	内服	Day 1-15		
HL-14 COPP q4wk 全2/4クルリンパ腫 IR/HR群(女児・10kg≦BW)	エンドキサン注	500 mg/ml	点滴静注	Day 1, 8	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	フレドニン	40 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
	プロカルバジン	100 mg/ml/日	内服	Day 1-15		
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8		
	エンドキサン注	500 mg/ml	点滴静注	Day 1, 8		
HL-14 COPP q4wk 全2/4クルリンパ腫 IR/HR群(女児・BW<10kg)	フレドニン	40 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減	28日	(小児)ホジキンリンパ腫
	プロカルバジン	100 mg/ml/日	内服	Day 1-15		
	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8		
	エンドキサン注	500 mg/ml	点滴静注	Day 1, 8		
	フレドニン	40 mg/ml/日	内服 or 静注	Day 1-15 →漸減		
1日前処置法(FLU+CY+TBI)移植前処置(生着不全)	フルダラ注	30 mg/ml	点滴静注	Day 1	1日	(小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	2000 mg/ml	点滴静注	Day 1		
R-ICE①② q3wk Burkittリンパ腫/B-ALL CNS(-)群	リツキシマブBS注	375 mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	イホマイド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	カルボプラチン注NK	635 mg/ml	点滴静注	Day 3		
	メトトレキセート注	15 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3		
R-ICE③ q3wk Burkittリンパ腫/B-ALL CNS(-)群	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	リツキシマブBS注	375 mg/ml	点滴静注	Day 1		
	イホマイド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	カルボプラチン注NK	635 mg/ml	点滴静注	Day 3		
R-ICE①② q3wk B細胞性リンパ腫/B-ALL CNS(+)群	メトトレキセート注	15 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3		
	リツキシマブBS注	375 mg/ml	点滴静注	Day 1, 3		
	イホマイド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
R-ICE③ q3wk B細胞性リンパ腫/B-ALL CNS(+)群	カルボプラチン注NK	635 mg/ml	点滴静注	Day 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	メトトレキセート注	15 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3, 10, 17		
	キロサイド注	30 mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3, 10, 17		
	リツキシマブBS注	375 mg/ml	点滴静注	Day 1		
	イホマイド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		

R-ICE① q3wk DLBCL CNS(-)群	リツキシマブBS注	375	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	イホマイド注	3000	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	カルボプラチン注NK	635	mg/ml	点滴静注	Day 3		
	メトトレキサート注	15	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3		
R-ICE② q3wk DLBCL CNS(-)群	キロサイド注	30	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	リツキシマブBS注	375	mg/ml	点滴静注	Day 1, 3		
	イホマイド注	3000	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	カルボプラチン注NK	635	mg/ml	点滴静注	Day 3		
R-ICE③ q3wk DLBCL CNS(-)群	リツキシマブBS注	375	mg/ml	点滴静注	Day 1	21日	(小児)非ホジキンリンパ腫
	イホマイド注	3000	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	エトボシド注 点静用	100	mg/ml	点滴静注	Day 3, 4, 5		
	カルボプラチン注NK	635	mg/ml	点滴静注	Day 3		
	メトトレキサート注	15	mg(年齢により用量変更)	脳脊髄腔注射	Day 3		
ネラパシ(650)単剤 q3wk リンパ腫	アラノジール注	650	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)リンパ芽球性リンパ腫
ネラパシ(650)単剤 q3wk 白血病	アラノジール注	650	mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)リンパ性白血病
シメツキマブ交替療法 CSFリンパ(1-3-5サイクル)神経芽腫 HR群	ユニツキシム点滴静注	17.5	mg/ml	点滴静注	Day 4, 5, 6, 7	28日	(小児)神経芽腫
	フィルグラスチム注	5	μg/kg	皮下注	Day 1-14		
	イムネース注	75	μl/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4		
シメツキマブ交替療法 IL-2リンパ(2-4-6サイクル)神経芽腫 HR群	イムネース注	100	μl/ml	点滴静注	Day 8, 9, 10, 11	28日	(小児)神経芽腫
	ユニツキシム点滴静注	17.5	mg/ml	点滴静注	Day 8, 9, 10, 11		
	ブスルフェクス点滴静注用	4	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(BW<9kg)	アルケラン注	2.33	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(9kg≦BW<10kg)	ブスルフェクス点滴静注用	4.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(10kg≦BW<16kg)	アルケラン注	2.33	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	4.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(16kg≦BW≦23kg)	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	4.4	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(23kg<BW≦34kg)	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	3.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 AML(34kg<BW)	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	3.2	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
Packer(ODDP+VCR+CPA)髄芽腫	シスプラチン注マルコ	75	mg/ml	点滴静注	Day 1	23日	(小児)髄芽腫
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 2, 8, 15		
	エンドキサン注	1000	mg/ml	点滴静注	Day 22, 23		
Packer(VCR+RT)q1wk 髄芽腫	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1	7日	(小児)髄芽腫
BLN単剤 24hr持続 サイクル1 Day0-28 白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	5	μg/ml(最大9μg)	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	42日	(小児)リンパ性白血病
BLN単剤 24hr持続 サイクル2-5 Day1-28 白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	15	μg/ml(最大28μg)	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28		
BLN単剤 24hr持続 サイクル6-9 Day1-28 白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	15	μg/ml(最大28μg)	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	42日	(小児)リンパ性白血病
BLN単剤 24hr持続 サイクル1 Day0-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	5	μg/ml	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	42日	(小児)リンパ性白血病
BLN単剤 24hr持続 サイクル2-5 Day1-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	28	μg/ml	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28		
BLN単剤 24hr持続 サイクル6-9 Day1-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	28	μg/ml	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	42日	(小児)リンパ性白血病
BLN単剤 24hr持続 サイクル1 Day0-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	28	μg/ml	点滴静注	Day 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	84日	(小児)リンパ性白血病
BLN単剤 24hr持続 サイクル2-5 Day1-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	28	μg/ml	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28		
BLN単剤 24hr持続 サイクル6-9 Day1-28 白血病(age<18歳&45kg≦BW)	ビリンサイト点滴静注用	28	μg/ml	点滴静注	Day 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	84日	(小児)リンパ性白血病
カセト)BLN単剤 72hr/96hr交互 Day1-28 白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	45	μg/ml(最大84μg)	点滴静注(72時間)	Day 1, 8, 15, 22	42日	(小児)リンパ性白血病
カセト)BLN単剤 96hr/72hr交互 Day1-28 白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	60	μg/ml(最大112μg)	点滴静注(96時間)	Day 4, 11, 18, 25		
カセト)BLN単剤 72h+96h持続[15μg/ml/d]白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	45	μg/ml(最大84μg)	点滴静注(72時間)	Day 1, 8, 15, 22	7日	(小児)リンパ性白血病
	ビリンサイト点滴静注用	60	μg/ml(最大112μg)	点滴静注(96時間)	Day 4, 11, 18, 25		
カセト)BLN単剤 96h+72h持続[15μg/ml/d]白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	45	μg/ml(最大84μg)	点滴静注(72時間)	Day 1, 8, 15, 22	7日	(小児)リンパ性白血病
	ビリンサイト点滴静注用	60	μg/ml(最大112μg)	点滴静注(96時間)	Day 4, 11, 18, 25		
カセト)BLN単剤 96hr持続[15μg/ml/d]白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	45	μg/ml(最大84μg)	点滴静注(72時間)	Day 5	4日	(小児)リンパ性白血病
	ビリンサイト点滴静注用	60	μg/ml(最大112μg)	点滴静注(96時間)	Day 1		
カセト)BLN単剤 72hr持続[15μg/ml/d]白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	45	μg/ml(最大84μg)	点滴静注(72時間)	Day 1	3日	(小児)リンパ性白血病
	ビリンサイト点滴静注用	60	μg/ml(最大112μg)	点滴静注(96時間)	Day 1		
カセト)BLN単剤 48hr持続[15μg/ml/d]白血病(age<18歳&BW<45kg)	ビリンサイト点滴静注用	30	μg/ml(最大56μg)	点滴静注(48時間)	Day 1	2日	(小児)リンパ性白血病
	ビリンサイト点滴静注用	15	μg/ml(最大28μg)	点滴静注(24時間)	Day 1		
原法sMTX(15-10-10-10相当)移植後GVHD予防(BW<10kg)	メトトレキサート注	0.5	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	(小児)造血幹細胞移植
メトトレキサート注	0.33	mg/kg	点滴静注	Day 3, 6, 11			
原法sMTX(15-10-10-10)移植後GVHD予防(10kg≦BW)	メトトレキサート注	15	mg/ml(最大15mg)	点滴静注	Day 1	14日	(小児)造血幹細胞移植
	メトトレキサート注	10	mg/ml(最大10mg)	点滴静注	Day 3, 6, 11		
減量sMTX(10-7-7-7)移植後GVHD予防(10kg≦BW)	メトトレキサート注	10	mg/ml(最大10mg)	点滴静注	Day 1	14日	(小児)造血幹細胞移植
	メトトレキサート注	7	mg/ml(最大7mg)	点滴静注	Day 3, 6, 11		
減量sMTX(10-7-7-7相当)移植後GVHD予防(BW<10kg)	メトトレキサート注	0.33	mg/kg	点滴静注	Day 1	14日	(小児)造血幹細胞移植
	メトトレキサート注	0.23	mg/kg	点滴静注	Day 3, 6, 11		
減弱前処置法(80y+FLU+CY)移植前処置[白血病悪性疾患](10kg≦BW)	フルダラ注	30	mg/ml	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5, -4	8日	(小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
	フルダラ注	1	mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5, -4		
減弱前処置法(80y+FLU+CY)移植前処置[白血病悪性疾患](BW<10kg)	エンドキサン注	60	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	8日	(小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	1	mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5, -4		
	エンドキサン注	60	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
TBI 120y+VP16(60/kg)+CY120 移植前処置[ALL](BW<30kg)	エトボシド注 点静用	30	mg/kg(12時間毎)	中心(シリンジ)	Day -5	5日	(小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
	エトボシド注 点静用	600	mg/ml(8時間毎)	中心(シリンジ)	Day -5		
TBI 120y+VP16(1800)+CY120 移植前処置[ALL](30kg≦BW)	エトボシド注 点静用	600	mg/ml(8時間毎)	中心(シリンジ)	Day -5	5日	(小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
	エトボシド注 点静用	600	mg/ml(8時間毎)	中心(シリンジ)	Day -5		
VDC/VC-E VDC(50%dose) q2wk Ewing肉腫/PNET(開始時<1歳)	オンコピン注	0.75	mg/ml	管注	Day 1	14日	(小児)ユーク肉腫
	エンドキサン注	600	mg/ml	点滴静注	Day 1		
	ドキソルビシン塩酸塩注	18.8	mg(力価)/ml	中心(シリンジ)	Day 1-2		
VA regimen VA-V-V(50%dose) 線維肉腫(BW<5kg&年齢<3ヵ月)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1		
	オンコピン注	0.0375	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15		
VA regimen VA-V-V(75%dose) 線維肉腫(BW<5kg&年齢<3ヵ月)	コスメゲン注	0.0375	mg(力価)/kg	管注	Day 1	21日	(小児)乳児線維肉腫
	オンコピン注	0.035	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15		
	コスメゲン注	0.035	mg(力価)/kg	管注	Day 1		
VA regimen VA-V-V(70%dose) 線維肉腫(BW<8kg&年齢<6ヵ月)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.05	mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1		
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
VA regimen VA-V-V 線維肉腫(10kg<BW&12ヵ月<年齢)	コスメゲン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)乳児線維肉腫
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1		
	コスメゲン注	1.5	mg(力価)/ml(最大2.3mg)	管注	Day 1		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)前処置 神経芽腫(BW<9kg)	ブスルフェクス点滴静注用	4	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	7日	(小児)造血幹細胞移植
	アルケラン注	2.33	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
	ブスルフェクス点滴静注用	4.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)前処置 神経芽腫(9kg≦BW<10kg)	アルケラン注	2.33	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	4.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
	アルケラン注	2.33	mg/kg	点滴静注	Day -3, -2		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 神経芽腫(10kg≦BW<16kg)	ブスルフェクス点滴静注用	4.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	7日	(小児)造血幹細胞移植
	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2		
	ブスルフェクス点滴静注用	4.4	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 神経芽腫(16kg≦BW≦23kg)	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	7日	(小児)造血幹細胞移植
	ブスルフェクス点滴静注用	3.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 神経芽腫(23kg<BW≦34kg)	ブスルフェクス点滴静注用	3.8	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	7日	(小児)造血幹細胞移植
	アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2		
	ブスルフェクス点滴静注用	3.2	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4		
ivBU4+MEL140相当(BU1日1回法)移植前処置 神経芽腫(34kg<BW)	ブスルフェクス点滴静注用	3.2	mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	7日	(小児)造血幹細胞移植

薬剤名	用量	単位	投与法	投与日	対象年齢
アルケラン注	70	mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180相当 移植前処置 (BW<9kg)	フルフェクス点滴静注用	4 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	1 mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	3 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180相当 移植前処置 (9kg≤BW<10kg)	フルフェクス点滴静注用	4.8 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	1 mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	3 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180相当 前処置 (年齢<1歳&10kg≤BW)	フルフェクス点滴静注用	4.8 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	1 mg/kg	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	3 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180 前処置 (1歳≤年齢&10kg≤BW<16kg)	フルフェクス点滴静注用	4.8 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	30 mg/ml	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	90 mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180 移植前処置 (16kg≤BW≤23kg)	フルフェクス点滴静注用	4.4 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	30 mg/ml	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	90 mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180 移植前処置 (23kg<BW≤34kg)	フルフェクス点滴静注用	3.8 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	30 mg/ml	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	90 mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	
JMML-11 ivBU4+FLU120+MEL180 移植前処置 (34kg<BW)	フルフェクス点滴静注用	3.2 mg/kg	点滴静注	Day -11, -10, -9, -8	11日 (小児)造血幹細胞移植
	フルダラ注	30 mg/ml	点滴静注	Day -7, -6, -5, -4	
	アルケラン注	90 mg/ml	点滴静注	Day -3, -2	
VA-regimen VA(50%dose) 線維肉腫 (BW<5kg&年齢<3ヵ月)	オンコピン注	0.025 mg/kg	管注	Day 1	21日 (小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.025 mg(力価)/kg	管注	Day 1	
VA-regimen VA(75%dose) 線維肉腫 (BW<5kg&年齢<3ヵ月)	オンコピン注	0.0375 mg/kg	管注	Day 1	21日 (小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.0375 mg(力価)/kg	管注	Day 1	
VA-regimen VA(70%dose) 線維肉腫 (BW<8kg&年齢<6ヵ月)	オンコピン注	0.035 mg/kg	管注	Day 1	21日 (小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.035 mg(力価)/kg	管注	Day 1	
VA-regimen VA 線維肉腫 (BW≤10kg or 年齢≤12ヵ月)	オンコピン注	0.05 mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1	21日 (小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	0.05 mg(力価)/kg(最大2.3mg)	管注	Day 1	
VA-regimen VA 線維肉腫 (10kg<BW&12ヵ月<年齢)	オンコピン注	1.5 mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1	21日 (小児)乳児線維肉腫
	コスメゲン注	1.5 mg(力価)/ml(最大2.3mg)	管注	Day 1	
ivBU4+CY120 移植前処置[造血器腫瘍](BW<9kg)	フルフェクス点滴静注用	4 mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5	8日 (小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
ivBU4+CY120 移植前処置[造血器腫瘍](9kg≤BW<16kg)	フルフェクス点滴静注用	4.8 mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5	8日 (小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
ivBU4+CY120 移植前処置[造血器腫瘍](16kg≤BW≤23kg)	フルフェクス点滴静注用	4.4 mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5	8日 (小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
ivBU4+CY120 移植前処置[造血器腫瘍](23kg<BW≤34kg)	フルフェクス点滴静注用	3.8 mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5	8日 (小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
ivBU4+CY120 移植前処置[造血器腫瘍](34kg<BW)	フルフェクス点滴静注用	3.2 mg/kg	点滴静注	Day -8, -7, -6, -5	8日 (小児)造血幹細胞移植
	エンドキサン注	60 mg/kg	点滴静注	Day -3, -2	
COG-A3961 サイクル1-7 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (1歳≤年齢&12kg≤BW)	カルボプラチン注NK	560 mg/ml	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	120 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	
COG-A3961 サイクル1-7 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳 or BW<12kg)	カルボプラチン注NK	18 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	4 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	カルボプラチン注NK	560 mg/ml	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル2-6 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (1歳≤年齢&12kg≤BW)	エンドキサン注	1000 mg/ml	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	30 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1	
	カルボプラチン注NK	18 mg/kg	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル2-6 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳 or BW<12kg)	エンドキサン注	33 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	1 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル3-5 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (1歳≤年齢&12kg≤BW)	エンドキサン注	1000 mg/ml	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	120 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	エンドキサン注	33 mg/kg	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル3-5 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳 or BW<12kg)	イトボシド注 点静用	4 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)神経芽腫
	カルボプラチン注NK	560 mg/ml	点滴静注	Day 1	
	イトボシド注 点静用	120 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	ドキシルビシン塩酸塩注	30 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル4 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳 or BW<12kg)	カルボプラチン注NK	18 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	4 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	ドキシルビシン塩酸塩注	1 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル8 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (1歳≤年齢&12kg≤BW)	エンドキサン注	1000 mg/ml	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	30 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1	
COG-A3961 サイクル8 q3wk 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳 or BW<12kg)	エンドキサン注	33 mg/kg	点滴静注	Day 1	21日 (小児)神経芽腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	1 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1	
EpSSG-NRSTS2005 DXR+FO 滑膜肉腫 (1歳≤年齢&10kg≤BW)	イホマド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)滑膜肉腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	37.5 mg(力価)/ml	点滴静注	Day 1, 2	
EpSSG-NRSTS2005 DXR+FO 滑膜肉腫 (3ヵ月≤年齢<1歳 or BW<10kg)	イホマド注	100 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)滑膜肉腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	1.25 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 1, 2	
EpSSG-NRSTS2005 FO単剤(DXR-RT非併用) 滑膜肉腫 (年齢<3ヵ月)	イホマド注	100 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)滑膜肉腫
EpSSG-NRSTS2005 FO単剤+RT 滑膜肉腫 (1歳≤年齢&10kg≤BW)	イホマド注	3000 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2	21日 (小児)滑膜肉腫
EpSSG-NRSTS2005 FO単剤+RT 滑膜肉腫 (3ヵ月≤年齢<1歳 or BW<10kg)	イホマド注	100 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2	21日 (小児)滑膜肉腫
EpSSG-NRSTS2005 FO単剤+RT 滑膜肉腫 (年齢<3ヵ月)	イホマド注	100 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2	21日 (小児)滑膜肉腫
COG-ARST0121 Regimen-1B VCR+CPT11 横紋筋肉腫 (10kg≤BW)	オンコピン注	1.5 mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8	21日 (小児)横紋筋肉腫
	リテカン塩酸塩点滴静注液	50 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
COG-ARST0121 Regimen-1B VCR+CPT11 横紋筋肉腫 (BW<10kg)	オンコピン注	0.05 mg/kg	管注	Day 1, 8	21日 (小児)横紋筋肉腫
	リテカン塩酸塩点滴静注液	1.67 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
	イホマド注	900 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
IE(FO+CDDP+VP16)q6wk 頭蓋内胚細胞腫 (2歳≤開始時)	イトボシド注 点静用	60 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	42日 (小児)胚細胞腫瘍
	シスプラチン注マクロ	20 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	
	イトボシド注 点静用	120 mg/ml	点滴静注	Day 1, 2, 3	
JEB(VP16+CBDDCA+BLM)q3-4wk 胚細胞腫瘍 (10kg≤BW)	カルボプラチン注NK	600 mg/ml	点滴静注	Day 2	21日 (小児)胚細胞腫瘍
	プレオ注射用	15 mg(力価)/ml(最大30mg)	中心(シリン)	Day 3	
JEB(VP16+CBDDCA+BLM)q3-4wk 胚細胞腫瘍 (BW<10kg)	イトボシド注 点静用	4 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)胚細胞腫瘍
	カルボプラチン注NK	20 mg/kg	点滴静注	Day 2	
	プレオ注射用	0.5 mg(力価)/kg	中心(シリン)	Day 3	
SIOPEN-99.2 CE q3wk 計2-4サイクル 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳&5kg≤BW)	カルボプラチン注NK	6.6 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	5 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	
SIOPEN-99.2 CE q3wk 計2-4サイクル 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳&BW<5kg)	カルボプラチン注NK	2.2 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日 (小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	1.67 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3	
	オンコピン注	0.05 mg/kg	管注	Day 1, 5	
SIOPEN-99.2 CA40 q3wk 最大4サイクル 神経芽腫 Ⅰ群 (年齢<1歳&5kg≤BW)	エンドキサン注	10 mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日 (小児)神経芽腫
	ドキシルビシン塩酸塩注	1 mg(力価)/kg	点滴静注	Day 4, 5	

SIOPEN-99.2 CA40 q3wk 最大4サイクル 神経芽腫 IR(年齢<1歳&BW<5kg)	オンコピン注	0.0167	mg/kg	管注	Day 1, 5	21日	(小児)神経芽腫
	エンドキサン注	3.3	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	ドキシルピリン塩酸塩注	0.33	mg(力価)/kg	中心(シリン)	Day 4, 5		
SIOP-NB-2009 CBDOCA+VP16 q3wk 神経芽腫 IR(1歳≦開始時)	カルボプラチン注NK	200	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3	21日	(小児)神経芽腫
	イトボシド注 点静用	150	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 5		
SIOP-NB-2009 VCR+DXR+CPA q3wk 神経芽腫 IR(1歳≦開始時)	エンドキサン注	300	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)神経芽腫
	ドキシルピリン塩酸塩注	30	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 4, 5		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8		
GPOH-MET-97交替療法 NN-1 q3wk 副腎皮質癌(10kg≦BW)	イホマイド注	1000	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	21日	(小児)副腎皮質癌
	ドキシルピリン塩酸塩注	35	mg(力価)/m ²	中心(シリン)	Day 2, 4		
	シタン	10	mg/kg	内服	連日		
GPOH-MET-97交替療法 NN-1 q3wk 副腎皮質癌(BW<10kg)	オンコピン注	0.05	mg/kg	管注	Day 1, 8	21日	(小児)副腎皮質癌
	イホマイド注	33	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	ドキシルピリン塩酸塩注	1.17	mg(力価)/kg	点滴静注	Day 2, 4		
GPOH-MET-97交替療法 NN-2 q3wk 副腎皮質癌(10kg≦BW)	シタン	10	mg/kg	内服	連日	21日	(小児)副腎皮質癌
	カルボプラチン注NK	125	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イトボシド注 点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
GPOH-MET-97交替療法 NN-2 q3wk 副腎皮質癌(BW<10kg)	シタン	10	mg/kg	内服	連日	21日	(小児)副腎皮質癌
	カルボプラチン注NK	4.17	mg/kg	中心(シリン)	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	イトボシド注 点静用	3.3	mg/kg	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
COG-D9803 VAC-V-V wk0 3-6-9-21-33 横紋筋肉腫 IR(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1		
	エンドキサン注	2200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-V-V wk0 3-6-9-21-33 横紋筋肉腫 IR(1歳≦年齢<3歳)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1		
	エンドキサン注	73	mg/kg	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-V-V wk0 3-6-9-21-33 横紋筋肉腫 IR(開始時<1歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1		
	エンドキサン注	36	mg/kg	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-休-休 wk12-24-27-30 横紋筋肉腫 IR(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1		
	エンドキサン注	2200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-休-休 wk12-24-27-30 横紋筋肉腫 IR(1歳≦年齢<3歳)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1		
	エンドキサン注	73	mg/kg	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-休-休 wk12-24-27-30 横紋筋肉腫 IR(開始時<1歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1		
	エンドキサン注	36	mg/kg	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VC-休-休 wk15 横紋筋肉腫 IR群(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	2200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1		
COG-D9803 VC-休-休 wk15 横紋筋肉腫 IR群(1歳≦開始時<3歳)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	73	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1		
COG-D9803 VC-休-休 wk15 横紋筋肉腫 IR群(開始時<1歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	36	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
COG-D9803 VC-V-V wk18 横紋筋肉腫 IR群(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	2200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
COG-D9803 VC-V-V wk18 横紋筋肉腫 IR群(1歳≦開始時<3歳)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	73	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15		
COG-D9803 VC-V-V wk18 横紋筋肉腫 IR群(開始時<1歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1		
	エンドキサン注	36	mg/kg	点滴静注	Day 1		
COG-D9803 VAC-VAC-休 wk36 横紋筋肉腫 IR群(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1, 8		
	エンドキサン注	2200	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 8		
COG-D9803 VAC-VAC-休 wk36 横紋筋肉腫 IR群(1歳≦開始時<3歳)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1, 8		
	エンドキサン注	73	mg/kg	点滴静注	Day 1, 8		
COG-D9803 VAC-VAC-休 wk36 横紋筋肉腫 IR群(開始時<1歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8	21日	(小児)横紋筋肉腫
	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1, 8		
	エンドキサン注	36	mg/kg	点滴静注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 Vrin-V-V wk1 20 横紋筋肉腫 HR(3歳≦開始時)	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	イリテガン塩酸塩点滴静注液	50	mg/m ² (最大100mg)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
COG-ARST0431 Vrin-V-V wk1 20 横紋筋肉腫 HR(1歳≦開始時<3歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15	21日	(小児)横紋筋肉腫
	イリテガン塩酸塩点滴静注液	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 Vrin-V-休 wk4 23-47-50 横紋筋肉腫HR(3歳≦年齢)	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8	21日	(小児)横紋筋肉腫
	イリテガン塩酸塩点滴静注液	50	mg/m ² (最大100mg)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 Vrin-V-休 wk4 23-47-50 横紋筋肉腫HR(1歳≦年齢<3歳)	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8	21日	(小児)横紋筋肉腫
	イリテガン塩酸塩点滴静注液	50	mg/m ² (最大100mg)	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 VDC-V wk7-11-15-28-32 横紋筋肉腫HR(3歳≦開始時)	ドキシルピリン塩酸塩注	37.5	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1, 2	14日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	1200	mg/m ²	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 VDC-V wk7-11-15-28-32 横紋筋肉腫HR(1歳≦年齢<3歳)	ドキシルピリン塩酸塩注	37.5	mg(力価)/m ²	点滴静注	Day 1, 2	14日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 VDC(50%)V wk7-11-15-28-32 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	ドキシルピリン塩酸塩注	18.8	mg(力価)/m ²	中心(シリン)	Day 1, 2	14日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 VDC(75%)V wk11-15-28-32 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	ドキシルピリン塩酸塩注	28.1	mg(力価)/m ²	中心(シリン)	Day 1, 2	14日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 VDC(100%)V wk15-28-32 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	ドキシルピリン塩酸塩注	37.5	mg(力価)/m ²	中心(シリン)	Day 1, 2	14日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 E-休 wk9 13-17-26-30 横紋筋肉腫HR(1歳≦開始時)	イホマイド注	1800	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)横紋筋肉腫
	イトボシド注 点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 E(50%)E-休 wk9 13-17-26-30 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	イホマイド注	900	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)横紋筋肉腫
	イトボシド注 点静用	50	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 E(75%)E-休 wk13 17-26-30 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	イホマイド注	1350	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)横紋筋肉腫
	イトボシド注 点静用	75	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8		
COG-ARST0431 E(100%)E-休 wk17-26-30 横紋筋肉腫(年齢<1歳)	イホマイド注	1800	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5	14日	(小児)横紋筋肉腫
	イトボシド注 点静用	100	mg/m ²	点滴静注	Day 1, 2, 3, 4, 5		
	オンコピン注	1.5	mg/m ² (最大2mg)	管注	Day 1		

COG-ARST0431 VAC-休-休 wk35-38-44 横紋筋肉腫HR(3歳≤開始時)	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	1200	mg/ml	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1		
COG-ARST0431 VAC-休-休 wk35-38-44 横紋筋肉腫HR(1歳≤年齢<3歳)	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1		
COG-ARST0431 VAC-休-休 wk35-38-44 横紋筋肉腫HR(開始時<1歳)	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	1.5	mg/ml(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
COG-ARST0431 VAC-V-V wk41 横紋筋肉腫 HR(3歳≤開始時)	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	1200	mg/ml	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.05	mg/kg(最大2mg)	管注	Day 1, 8, 15		
COG-ARST0431 VAC-V-V wk41 横紋筋肉腫 HR(1歳≤開始時<3歳)	コスメゲン注	0.045	mg(力価)/kg(最大2.5mg)	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15		
COG-ARST0431 VAC-V-V wk41 横紋筋肉腫 HR(開始時<1歳)	コスメゲン注	0.025	mg(力価)/kg	管注	Day 1	21日	(小児)横紋筋肉腫
	エンドキサン注	40	mg/kg	点滴静注	Day 1		
	オンコピン注	0.025	mg/kg	管注	Day 1, 8, 15		