食道の内視鏡的粘膜切除術・粘膜下層剥離術

を受けられる方へ

◆ 私たちは、入院生活や治療が順調に進むように下記の計画に基づき援助します。

お名前 @{Patient.Name} 様

主治医

説明看護師

の石削		@{Patient.Name} /								
	日付	入院前日までに	手術前日	手(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目(退院日)	退院後
			月 日()	月 日()	月 日()	月 日()	月 日()	月 日()	月 日()	
目標·退院基準		治療の内容について理 解できる	・治療の必要性を言える ・治療に対する不安の訴えがない	・治療の必要性を言える ・治療に対する不安の訴えがない	・吐血がない ・心高部(みぞおち周辺)の不快感がない ・転倒予防行動(安全に歩行するために注意した行動)が実施できる	・吐血・下血がない ・心窩部(みぞおち周辺)の 不快感がない ・転倒予防行動(安全に歩 行するために注意した行動) が実施できる	・吐血・下血がない ・心窩部(みぞおち周辺)の 不快感がない ・転倒予防行動(安全に歩行 するために注意した行動)が実 施できる	・吐血・下血がない ・心窩部(みぞおち周辺)の 不快感がない ・転倒予防行動(安全に歩 行するために注意した行動) が実施できる	・吐血・下血がない ・心窩部(みぞおち周辺)の 不快感がない ・日常生活の注意点を理解し 退院後の生活の不安がない	・定期受診をする ・下血・心窩部痛(みぞおち周辺の痛み)、吐血時に病院へ連絡し相談できる
	検査			検温を行います	Ø	検温を行います 採血があります	9	検温を行います	Ø	
	注射			点滴をします		点滴を続けます	問題なければ 点滴を抜きます			
ī	内服薬	医師の指示に 従ってください	薬剤師が、常用薬の確認を 行います。 通常通りに内服可能ですが 血糖降下薬・抗血栓薬は 別途中止の指示がある場合が あります。	看護師がお渡しした薬を 6時に少量の水 で内服します。 その後は 中止 です。	内服中止です	採血結果をみて ご案内します				
	食事		夕食は流動食が出ます。 病院食以外は 食べないでください。	2日間、食事は食べられません			流動食	潰瘍五分粥食	全粥軟菜食	治療した部位に影響を及 ぼしますので、退院後は 消化の良いものを摂取し てください
	水分		水分は水・お茶のみ にしてください	水分は6時以降飲めません	X	採血結果によって 水・茶・ スポーツドリンクが飲めま す				
	安静度	制限はありません	制限はありません	制限はありません	3時間ペッド上安静です。起き上がったり、ペッドから降りずに安静に過ごしてください。当日はトイレ以外はペッド上で安静に過ごしてください	病棟内のみ歩けます	制限はありません			退院後は激しい運動を控え、徐々に活動範囲を増 やしてください
活動	排泄	制限はありません	制限はありません	治療前 にトイレを 済ませてください	ヘッド上安静期間中はヘッド上での排泄です。最初にトイレに歩く時は、看護師が付き添いますので、必ずナースコールをしてください。	制限はありません				
	清潔	制限はありません	制限はありません			体をふきます	シャワー浴			※退院後から入浴可能 (長風呂は控えて下さい)
教育 説明 その他			 ◆入院後に看護師から治療や処置などの流れについて説明があります。できるだけお部屋でお過ごしください。 ◆処置用にボタンのついていない寝衣をご準備ください。病衣のレンタルができます(有料です) 	●貴重品は金庫で保管してください。 入れ歯・眼鏡・時計等の金属類を外します。 ●処置中は眠くなるお薬を使います。気分が悪い、痛みが強いなどありましたら、 医師または看護師にお声がけください	● みぞおち周辺の痛みや吐き気、吐血時なおつらい症状がある時には、遠慮せず看護師にお知らせください安心して療養ができるよう援助します ● 黒い便がみられた場合には、便を流さずトイレから看護師をお呼びくださ		管理栄養士より 退院後の食事について 30分間の栄養指導が あります : 〜 場所:にし棟1階 エレベーター前			●食事や日常生活の注意 点について、別紙を用いて ご説明いたします みぞおち周辺の痛み・吐 血・黒い梗・めまい・ふらうさ などがみられた場合には、 病院へご連絡ください ●飲酒、喫煙は禁止です
	備考									